

Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2012**-Tabelle I: Überblick-**

| Tierart / Erzeugnis | | Probenahmeort | gesamt Stoffgruppe A und B Rückstandsuntersuchungen gesamt | | | Verteilung der Stoffgruppe AB auf die Gruppen | | | | | | Verteilung der Stoffgruppe B auf die Gruppen | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--|-----|-------|---|---|------|---|-----|-------|--|---|------|---------------------------------------|---|------|-------|-----|-------|
| | | | | | | A | | | B | | | B1 | | | B2 | | | B3 | | |
| | | | verbotene Stoffe mit anaboler Wirkung und andere verbotene bzw. nicht zugelassene Stoffe | | | Tierarzneimittel und Kontaminanten gesamt | | | antibakteriell wirksame Stoffe ohne Hemmstofftests* | | | sonstige Tierarzneimittel | | | andere Stoffe und Umweltkontaminanten | | | | | |
| N | P | in % | N | P | in % | N | P | in % | N | P | in % | N | P | in % | N | P | in % | | | |
| Rinder | Kälber | EB | 547 | | | 354 | | | 255 | | | 4 | | | 225 | | | 27 | | |
| | | SB | 993 | 8 | 0,81 | 515 | | | 617 | 8 | 1,30 | 259 | | | 305 | | | 95 | 8 | 8,42 |
| | Mastrinder | EB | 2.770 | 3 | 0,11 | 2.081 | 3 | 0,14 | 1.128 | | | 52 | | | 948 | | | 148 | | |
| | | SB | 7.344 | 20 | 0,27 | 4.004 | | | 4.166 | 20 | 0,48 | 1.945 | 2 | 0,10 | 1.855 | | | 626 | 18 | 2,88 |
| | Kühe | EB | 1.088 | | | 734 | | | 552 | | | 31 | | | 479 | | | 68 | | |
| | | SB | 2.252 | 26 | 1,15 | 924 | | | 1.608 | 26 | 1,62 | 660 | 3 | 0,45 | 886 | 7 | 0,79 | 255 | 16 | 6,27 |
| Schweine | | EB | 1.625 | | | 1.110 | | | 1.142 | | | 13 | | | 1.076 | | | 63 | | |
| | | SB | 28.888 | 149 | 0,52 | 13.880 | 2 | 0,01 | 22.657 | 147 | 0,65 | 9.905 | 8 | 0,08 | 10.791 | 3 | 0,03 | 3.433 | 136 | 3,96 |
| Schafe / Ziegen | | SB | 600 | 8 | 1,33 | 272 | | | 479 | 8 | 1,67 | 213 | | | 228 | | | 76 | 8 | 10,53 |
| Pferde | | SB | 160 | 6 | 3,75 | 78 | 1 | 1,28 | 113 | 5 | 4,42 | 26 | | | 64 | 1 | 1,56 | 28 | 4 | 14,29 |
| Kaninchen | | EB / SB | 33 | | | 7 | | | 27 | | | 16 | | | 11 | | | 4 | | |
| Wild | | EB / eV | 213 | 29 | 13,62 | 32 | | | 191 | 29 | 15,18 | 20 | | | 64 | | | 145 | 29 | 20,00 |
| Geflügel | Masthähnchen | EB | 912 | | | 882 | | | 554 | | | 59 | | | 496 | | | 53 | | |
| | | SB | 4.183 | | | 2.025 | | | 3.276 | | | 1.574 | | | 1.539 | | | 395 | | |
| | Lege-/ Suppenhühner | EB | 96 | 1 | 1,04 | 62 | | | 72 | 1 | 1,39 | 8 | | | 52 | 1 | 1,92 | 15 | | |
| | | SB | 240 | | | 85 | | | 202 | | | 67 | | | 104 | | | 43 | | |
| | Truthühner | EB | 1.138 | 1 | 0,09 | 1.103 | | | 615 | 1 | 0,16 | 59 | | | 553 | 1 | 0,18 | 57 | | |
| | | SB | 2.151 | | | 990 | | | 1.608 | | | 755 | | | 732 | | | 182 | | |
| sonstiges | EB | 72 | | | 69 | | | 40 | | | 6 | | | 32 | | | 6 | | | |
| | SB | 284 | | | 125 | | | 222 | | | 112 | | | 105 | | | 32 | | | |
| Aqua- kulturen | Forellen | EB | 381 | 4 | 1,05 | 96 | | | 363 | 4 | 1,10 | 44 | | | 92 | | | 327 | 4 | 1,22 |
| | Karpfen | EB | 182 | 1 | 0,55 | 39 | | | 173 | 1 | 0,58 | 21 | | | 53 | | | 148 | 1 | 0,68 |
| | sonstige | EB | 22 | | | 6 | | | 22 | | | 8 | | | 3 | | | 21 | | |
| Milch | | EB / eV | 1.902 | 3 | 0,16 | 1.379 | | | 1.901 | 3 | 0,16 | 1.438 | 1 | 0,07 | 1.570 | 2 | 0,13 | 351 | | |
| Eier | | EB / eV | 709 | 5 | 0,71 | 148 | | | 681 | 5 | 0,73 | 150 | 1 | 0,67 | 478 | 1 | 0,21 | 181 | 3 | 1,66 |
| Honig | | EB / eV | 213 | 4 | 1,88 | 51 | | | 209 | 4 | 1,91 | 133 | | | 127 | 1 | 0,79 | 169 | 3 | 1,78 |

EB = Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB = Probenahme im Schlachtbetrieb, eV = Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N: Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P: Anzahl positiver Befunde

* Screeninguntersuchungen mittels Dreiplattentest auf Hemmstoffe: s. Tabelle 3

Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2012**-Tabelle II: Zusammenfassung der Stoffe in Gruppen-**

| Stoffgruppen | Untergruppen | Kälber | | | | Rinder Mastrinder | | | | Kühe | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | |
|---|--|--------|-------------------------------------|-----|---------------|----------------------|---|-------|---|-------|---|-----|---|----------|---|-------|---|-------------------|---|---------|---|----------------|---|------|---|----|
| | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | SB | | EB / SB | | EB / eV | | | | |
| | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| A Stoffe mit anaboler Wirkung und nicht zugelassene Stoffe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Stilbene | 36 | | 30 | | 202 | | 235 | | 67 | | 40 | | 81 | | 664 | | 20 | | 10 | | 2 | | 4 | | |
| A2 | Thyreostatika | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 606 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | |
| A3 | Steroide | A3A | synthetische Androgene | 54 | | 34 | | 276 | | 236 | | 79 | | 27 | | 70 | | 578 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 |
| | | A3B | synthetische Estrogene | 51 | | 34 | | 257 | | 221 | | 74 | | 25 | | 67 | | 556 | | 7 | | 11 | | | | 4 |
| | | A3C | synthetische Gestagene | | | | | | | 312 | | | | | | | | 436 | | | | | | | | |
| | | A3D | natürliche Steroide | 13 | | 7 | | 59 | | 65 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | 1 |
| A3 | Gesamt | 67 | | 41 | | 333 | | 611 | | 84 | | 33 | | 70 | | 1.014 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | |
| A4 | Resorcyssäure-Lactone | 28 | | 33 | | 166 | 2 | 202 | | 72 | | 69 | | 71 | | 627 | | 21 | | 9 | 1 | 1 | | 3 | | |
| A5 | β-Agonisten | 82 | | 80 | | 409 | | 561 | | 129 | | 152 | | 156 | | 1.628 | | 33 | | 11 | | | | 4 | | |
| A6 | Stoffe des Anhangs IV der Verordnung (EWG) 2377/90 * | A6A | Amphenicole | 119 | | 174 | | 862 | | 1.374 | | 327 | | 372 | | 216 | | 2.728 | | 66 | | 13 | | 3 | | 7 |
| | | A6B | Nitrofurane | | | 44 | | | | 197 | | | | 49 | | | | 609 | | 27 | | 6 | | | | 2 |
| | | A6C | Nitroimidazole | 27 | | 43 | | 204 | 1 | 200 | | 57 | | 80 | | 522 | | 3.975 | 2 | 16 | | 5 | | | | 3 |
| | | A6D | Beruhigungsmittel/ Sedativa | 1 | | 7 | | 6 | | 84 | | 38 | | 12 | | 20 | | 1.452 | | 43 | | 10 | | | | |
| | | A6E | sonst. antib. wirks. Subst. | | | 38 | | 1 | | 304 | | 3 | | 78 | | | | 1.417 | | 38 | | 8 | | | | 1 |
| A6 | Gesamt | 147 | | 293 | | 1.073 | 1 | 2.116 | | 425 | | 568 | | 757 | | 9.457 | 2 | 186 | | 39 | | 3 | | 13 | | |
| B Tierarzneimittel und Kontaminanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | antibakteriell Stoffe ohne Hemmstoffe** | B1A | Aminoglycoside | | | 47 | | | | 307 | 1 | | | 145 | 1 | | | 925 | 1 | 25 | | | 3 | | 1 | |
| | | B1C | Cephalosporine | | | 34 | | | | 212 | | | | 67 | | | | 1.020 | | 18 | | 3 | | 2 | | |
| | | B1D | Penicilline | | | 66 | | 1 | | 365 | 1 | 3 | | 99 | 1 | | | 1.623 | 1 | 52 | | 8 | | 11 | | 1 |
| | | B1E | Chinolone | | | 132 | | 1 | | 725 | | 3 | | 224 | | | | 4.318 | 2 | 74 | | 8 | | 12 | | 7 |
| | | B1F | Diaminopyrimidine | | | 56 | | 1 | | 236 | | 3 | | 81 | | | | 1.793 | 1 | 51 | | 8 | | 10 | | 2 |
| | | B1H | Linkosamide | | | 50 | | 1 | | 192 | | 3 | | 84 | | | | 1.762 | | 40 | | 7 | | 4 | | 1 |
| | | B1I | Macrolide | | | 45 | | 1 | | 262 | | 3 | | 110 | | | | 2.486 | | 51 | | 8 | | 5 | | 1 |
| | | B1L | Sulfonamide | | | 86 | | 1 | | 523 | | 3 | | 167 | | | | 3.179 | 2 | 82 | | 16 | | 11 | | 6 |
| | | B1M | Tetracycline | | | 131 | | 1 | | 936 | | 3 | | 286 | 1 | | | 4.091 | 3 | 100 | | 16 | | 11 | | 7 |
| | | B1N | Amphenicole | 4 | | 20 | | 51 | | 111 | | 28 | | 49 | | 13 | | 886 | | 36 | | 3 | | | | 2 |
| | | B1O | Pleuromutiline | | | 30 | | 1 | | 172 | | 3 | | 51 | | | | 1.431 | | 40 | | 8 | | 2 | | |
| | | B1P | sonst. Stoffe mit antibakt. Wirkung | | | 13 | | | | 43 | | | | 23 | | | | 703 | | 4 | | 2 | | | | |
| | | B2 | sonstige Tierarznei- mittel | B2a | Anthelmintika | 1 | | 41 | | 20 | | 240 | | 26 | | 88 | | 10 | | 1.111 | 2 | 41 | | 12 | | 2 |
| B2b1 | Kokzidiostatika | | | | | 41 | | | | 180 | | | | 85 | | | | 382 | | 16 | | 6 | | 8 | | 6 |
| B2b2 | Nitroimidazole | | | 27 | | 31 | | 204 | | 169 | | 57 | | 64 | | 522 | | 3.702 | | 17 | | 5 | | | | 3 |
| B2c1 | Carbamate | | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | 70 | | 1 | | | | | | 6 |
| B2c2 | Pyrethroide | | | | | 16 | | | | 176 | | | | 46 | | | | 610 | | 7 | | 3 | | | | 35 |
| B2d | Beruhigungsmittel | | | 1 | | 7 | | 6 | | 84 | | 38 | | 12 | | 20 | | 1.818 | 1 | 44 | | 10 | 1 | | | |

Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2012**-Tabelle II: Zusammenfassung der Stoffe in Gruppen-**

| Stoffgruppen | Untergruppen | Kälber | | | | | | | | | | | | Rinder Mastrinder | | | | Kühe | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|--|--|--------|---|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----------------------|-----|-------|-----|------|---|----|---|----------|----|---------|----|-------------------|--|--------|--|----------------|--|------|--|
| | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | SB | | SB | | EB / SB | | EB / eV | | | | | | | | | |
| | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | | | | |
| B2 sonstige Tierarznei- mittel | B2e nichtsteroidale entzündungshemmende Mittel | 192 | | 108 | | 688 | | 683 | | 392 | | 326 | 1 | 536 | | 2.326 | | 104 | | 30 | | 1 | | 5 | | | | | | | | | |
| | B2f1 Sonstige Stoffe mit antibakt. und antiprotoz. Wirk. | | | 15 | | | | 78 | | | | 43 | | | | 771 | | 5 | | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| | B2f2 Sonstige Ektoparasitika | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2f3 Synthetische Kortikosteroide | 1 | | 86 | | 6 | | 419 | | 38 | | 325 | 6 | 20 | | 727 | | 69 | | 10 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | B2f4 Sonstige Stoffe mit pharmakolog. Wirk. | 5 | | 12 | | 36 | | 23 | | 4 | | | | 10 | | 110 | | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| B3 andere Stoffe und Umwelt- kontaminanten | B3a organische Chlorverbindungen einschließlich PCB | | | 29 | | | | 249 | | | | 79 | | | | 1.081 | | 23 | 1 | 6 | | 2 | | 110 | 1 | | | | | | | | |
| | B3b organische Phosphorverbindungen | | | 9 | | | | 184 | | | | 41 | | | | 525 | | 11 | | 4 | | 1 | | 43 | | | | | | | | | |
| | B3c Chemische Elemente | | | 29 | 8 | 1 | | 186 | 18 | | | 92 | 16 | | | 1.485 | 136 | 31 | 7 | 9 | 4 | 3 | | 106 | 29 | | | | | | | | |
| | B3d Mycotoxine | 25 | | 32 | | 141 | | 167 | | 68 | | 74 | | 63 | | 738 | | 19 | | 11 | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
| | B3e Farbstoffe | | | | | | | | | | | 54 | | | | 707 | | 11 | | 5 | | 1 | | 73 | | | | | | | | | |
| | B3f sonstige Stoffe | | | 19 | | | | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f1 Amide | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f3 Azole | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f4 Cyanopyrrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f5 Dinitroverbindungen | | | 2 | | | | 45 | | | | 24 | | | | 138 | | 11 | | 1 | | 1 | | 20 | | | | | | | | | |
| | B3f6 Harnstoffe | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f7 Imide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f10 Pyrimidine | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f12 Triazine | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3f13 Amine | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 49 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3f20 sonstige organische Stickstoffverbindungen | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3f21 Organische Schwefelverbindungen | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3f31 sonstige organische Verbindungen | 2 | | 4 | | 6 | | 151 | | | | 31 | | | | 229 | | 8 | | 2 | | 1 | | 30 | | | | | | | | | | |

EB = Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB = Probenahme im Schlachtbetrieb, eV = Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N: Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P: Anzahl positiver Befunde

" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen

* abgelöst durch Tabelle 2 der VO (EG) Nr. 37/2010

** Screeninguntersuchungen mittels Dreiplattentest auf Hemmstoffe: s. Tabelle 3

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------|-----|----|-----|------|-----|-----|----|----------|-----|----|-----|-------------------|-----|--------|----|----------------|----|------|---|--|---|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | |
| Stilbene | Stilbene | A 1 | Dienestrol | 35 | | 30 | | 199 | | 235 | | 65 | | 40 | | 80 | | 664 | | 20 | | 10 | | 2 | | 4 | | | |
| | | | Diethylstilbestrol | 36 | | 30 | | 202 | | 235 | | 67 | | 40 | | 81 | | 664 | | 20 | | 10 | | 2 | | 4 | | | |
| | | | Hexestrol | 36 | | 30 | | 202 | | 235 | | 67 | | 40 | | 81 | | 664 | | 20 | | 10 | | 2 | | 4 | | | |
| Thyreostatika | Thyreostatika | A 2 | 2-Benzimidazolethiol | 1 | | 18 | | | | 79 | | | | 36 | | | | 288 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | | | Tapazol | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 606 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | | |
| | | | Methylthiouracil | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 606 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | | |
| | | | Phenylthiouracil | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 606 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | | |
| | | | Propylthiouracil | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 606 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | | |
| | | | Thiouracil | 1 | | 44 | | | | 356 | | | | 73 | | | | 601 | | 12 | | 6 | | | | 4 | | | |
| | | | Steroide | synthetische Androgene | A3 A | 16-beta-Hydroxystanozolol | 46 | | 15 | | 249 | | 163 | | 79 | | 21 | | 54 | | 486 | | 16 | | 11 | | | | 4 |
| 17-alpha-Trenbolon | 53 | | | | | 34 | | 268 | | 230 | | 77 | | 27 | | 61 | | 515 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | | |
| 17-beta-19-Nortestosteron | 54 | | | | | 34 | | 272 | | 236 | | 78 | | 27 | | 70 | | 578 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | | |
| 17-alpha-Boldenon | 54 | | | | | 34 | | 272 | | 236 | | 78 | | 27 | | 62 | | 530 | | 17 | | 12 | | | | 4 | | | |
| 17-beta-Boldenon | 54 | | | | | 34 | | 272 | | 236 | | 78 | | 27 | | 70 | | 578 | | 17 | | 12 | | | | 4 | | | |
| Epinandrolon | 54 | | | | | 34 | | 271 | | 235 | | 78 | | 27 | | 62 | | 530 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | | |
| Methylboldenon Dianabol | 1 | | | | | | | 9 | | 8 | | 3 | | 1 | | 2 | | 12 | | 10 | | | | | | | | | |
| Methyltestosteron | 54 | | | | | 34 | | 272 | | 236 | | 78 | | 27 | | 70 | | 577 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | | |
| Stanozolol | 54 | | | | | 34 | | 272 | | 236 | | 79 | | 27 | | 69 | | 578 | | 17 | | 12 | | | | 4 | | | |
| 17-beta-Trenbolon | 54 | | | | | 34 | | 268 | | 230 | | 77 | | 27 | | 69 | | 563 | | 17 | | 12 | | 1 | | 4 | | | |
| synthetische Estrogene | A3 B | 17-alpha-Ethinylestradiol | | | | 51 | | 34 | | 257 | | 221 | | 74 | | 25 | | 67 | | 556 | | 7 | | 11 | | | | 4 | |
| synthetische Gestagene | | A3 C | | | | Acetoxyprogesteron | | | | | | 50 | | | | | | | | 83 | | | | | | | | | |
| Chlormadinonacetat | | | | | | | | | | | 311 | | | | | | | | 436 | | | | | | | | | | |
| Delmadinonacetat | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| Flugeston-17-acetat | | | | | | | | 53 | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| Medroxyprogesteronacetat | | | | | | | | 312 | | | | | | | | 436 | | | | | | | | | | | | | |
| Megestrolacetat | | | | | | | | 312 | | | | | | | | 436 | | | | | | | | | | | | | |
| Melengestrolacetat | | | | | | | | 297 | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---|-----|---|------------|---|-----|---|------|---|-----|---|----------|---|-------|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|------|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Steroide | natürliche Steroide | A3 D | 13 | | 7 | | 56 | | 63 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | 11 | | 7 | | 57 | | 54 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Resorcyssäure- Lactone | A 4 | Taleranol | 26 | | 32 | | 144 | 1 | 158 | | 70 | | 66 | | 66 | | 576 | | 18 | | 8 | | 1 | | 3 | |
| | | Zearalanon | 25 | | 32 | | 141 | | 156 | | 68 | | 65 | | 63 | | 568 | | 18 | | 8 | | 1 | | 3 | |
| | | Zeranol | 28 | | 33 | | 166 | 2 | 202 | | 72 | | 69 | | 71 | | 627 | | 21 | | 9 | 1 | 1 | | 3 | |
| Beta- Agonisten | A 5 | Brombuterol | 71 | | 73 | | 372 | | 544 | | 118 | | 140 | | 142 | | 1.385 | | 33 | | 11 | | | | 4 | |
| | | Carbuterol | 9 | | 24 | | 136 | | 113 | | 9 | | 5 | | 34 | | 270 | | 23 | | 6 | | | | | |
| | | Chlorbrombuterol | 60 | | 54 | | 330 | | 493 | | 113 | | 116 | | 106 | | 1.074 | | 31 | | 10 | | | | 4 | |
| | | Cimaterol | 61 | | 53 | | 338 | | 489 | | 113 | | 119 | | 111 | | 1.150 | | 31 | | 10 | | | | 4 | |
| | | Cimbuterol | 56 | | 48 | | 268 | | 345 | | 96 | | 108 | | 96 | | 904 | | 28 | | 9 | | | | 3 | |
| | | Clenbuterol | 71 | | 73 | | 372 | | 544 | | 118 | | 140 | | 142 | | 1.385 | | 33 | | 11 | | | | 4 | |
| | | Clencyclohexerol | 26 | | 40 | | 187 | | 203 | | 34 | | 45 | | 69 | | 669 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Clenhexerol Hydrochlorid | | | 8 | | 10 | | 10 | | 5 | | 2 | | 4 | | 33 | | 16 | | 5 | | | | | |
| | | Clenisopenterol | 25 | | 39 | | 182 | | 195 | | 19 | | 24 | | 65 | | 657 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Clenpenterol | 27 | | 40 | | 198 | | 213 | | 34 | | 49 | | 74 | | 750 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Clenproperol | 60 | | 54 | | 330 | | 496 | | 113 | | 120 | | 106 | | 1.080 | | 31 | | 10 | | | | 4 | |
| | | Fenoterol | 25 | | 40 | | 181 | | 203 | | 34 | | 45 | | 69 | | 580 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Hydroxymethylclenbuterol | 25 | | 39 | | 182 | | 203 | | 19 | | 28 | | 65 | | 668 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Isoxsuprin | 26 | | 40 | | 187 | | 203 | | 34 | | 45 | | 69 | | 669 | | 26 | | 8 | | | | 1 | |
| | | Mabuterol | 67 | | 73 | | 359 | | 544 | | 118 | | 140 | | 136 | | 1.385 | | 33 | | 11 | | | | 4 | |
| | | Mapenterol | 56 | | 48 | | 268 | | 345 | | 96 | | 108 | | 96 | | 904 | | 28 | | 9 | | | | 3 | |
| | | Orciprenalinalin | | | 7 | | 22 | | 12 | | 3 | | 2 | | 6 | | 37 | | 11 | | 5 | | | | | |
| | | Pirbuterol | | | 7 | | 8 | | 9 | | 4 | | 1 | | 4 | | 27 | | 16 | | 1 | | | | | |
| | | Ractopamin | 40 | | 53 | | 281 | | 363 | | 46 | | 61 | | 95 | | 1.120 | | 29 | | 9 | | | | 2 | |
| | | Ritodrin | 2 | | 10 | | 30 | | 22 | | 23 | | 23 | | 11 | | 55 | | 16 | | 5 | | | | 1 | |
| | | Salbutamol | 71 | | 73 | | 371 | | 542 | | 118 | | 140 | | 142 | | 1.385 | | 33 | | 11 | | | | 4 | |
| | | Salmeterol, | 4 | | 12 | | 83 | | 76 | | 8 | | 2 | | 19 | | 56 | | 18 | | 6 | | | | 1 | |
| | | Terbutalin | 61 | | 54 | | 339 | | 495 | | 113 | | 120 | | 111 | | 1.150 | | 31 | | 10 | | | | 4 | |
| Tulobuterol | 27 | | 40 | | 198 | | 205 | | 34 | | 45 | | 74 | | 721 | | 26 | | 8 | | | | 1 | | | |
| Zilpaterol | 39 | | 53 | | 268 | | 346 | | 46 | | 57 | | 94 | | 1.055 | | 29 | | 9 | | | | 2 | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | | |
|--|--------------|--|--|-----|----|-----|------------|-----|-----|-------|------|-----|----|-----|----------|-----|-------|-------|-------------------|-----|--------|----|----------------|---|------|---|---|---|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | |
| Stoffe des Anhangs IV der VO (EWG) Nr 2377/1990 | Amphenicole | A6 A | Chloramphenicol | 119 | | 174 | | 862 | | 1.374 | | 327 | | 372 | | 216 | | 2.728 | | 66 | | 13 | | 3 | | 7 | | | |
| abgelöst durch Tabelle 2 der VO (EG) Nr. 37/2010 | Nitrofurane | A6 B | 1-Aminohydantoin (AHD) | | 36 | | | | 184 | | | | | 49 | | | | 537 | | 26 | | 5 | | | | 2 | | | |
| | | | 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazid | | 44 | | | | 196 | | | | | | 49 | | | | 594 | | 27 | | 6 | | | | 2 | | |
| | | | 3-Amino-2-oxazolidinon (AOZ) | | 44 | | | | 197 | | | | | | 49 | | | | 609 | | 27 | | 6 | | | | 2 | | |
| | | | 5-Methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinon (AMOZ) | | 44 | | | | 197 | | | | | | 49 | | | | 609 | | 27 | | 6 | | | | 2 | | |
| | | | Furaltadon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Furazolidon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nifursol | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| | | | Nitrofurantoin Nitrofurazon Semicarbazid (SEM) | | | 43 | | | | 197 | | | | | 49 | | | | | 608 | | 27 | | 6 | | | | 1 | |
| Nitroimidazole | A6 C | Dimetridazol | 27 | | 31 | | 204 | | 167 | | 57 | | 64 | | 522 | | 3.692 | | 16 | | 5 | | | | 2 | | | | |
| | | Dimetridazol-OH HMMNI | 27 | | 31 | | 204 | | 167 | | 57 | | 64 | | 522 | | 3.692 | | 16 | | 5 | | | | 2 | | | | |
| | | Metronidazol | 27 | | 43 | | 204 | 1 | 200 | | 57 | | 80 | | 522 | | 3.975 | 2 | 16 | | 16 | | 5 | | | 3 | | | |
| | | Metronidazol-OH | 27 | | 43 | | 204 | | 200 | | 57 | | 80 | | 522 | | 3.975 | | 16 | | 16 | | 5 | | | 3 | | | |
| | | Ronidazol | 27 | | 31 | | 204 | | 167 | | 57 | | 64 | | 522 | | 3.692 | | 16 | | 16 | | 5 | | | 2 | | | |
| Beruhigungsmittel/ Sedativa | A6 D | Chlorpromazin | 1 | | 7 | | 6 | | 84 | | 38 | | 12 | | 20 | | 1.452 | | 43 | | 10 | | | | | | | | |
| sonst. antib. wirks. Substanzen | A6 E | Dapson | | | 38 | | 1 | | 304 | | 3 | | 78 | | | | 1.417 | | 38 | | 8 | | | | 1 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | |
|---|---------------------|--|--------|---|----|------------|-----|----|------|-----|---|----------|-----|-------|-------|-------------------|----|--------|---|----------------|----|--------|---|---|
| | | | Kälber | | | Mastrinder | | | Kühe | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | |
| | | | EB | P | | EB | P | | EB | P | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| | | | N | | | N | | | N | | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Aminoglycoside B1 A | Aminosidin | | | 37 | | | | 255 | | | 122 | | | 631 | | 24 | | | | 3 | | | |
| | | Apramycin | | | 37 | | | | 255 | | | 122 | | | 632 | | 24 | | | | 3 | | | |
| | | Dihydrostreptomycin | | | 47 | | | | 306 | | | 145 | | | 925 | 1 | 25 | | | | 3 | | | 1 |
| | | Gentamicin | | | 47 | | | | 307 | 1 | | 145 | 1 | | 924 | | 24 | | | | 3 | | | 1 |
| | | Kanamycin | | | 37 | | | | 261 | | | 122 | | | 641 | | 24 | | | | 3 | | | |
| | | Nemadectin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neomycin | | | 47 | | | | 293 | | | 138 | | | 923 | | 24 | | | | 3 | | | 1 |
| | | Spectinomycin | | | 44 | | | | 198 | | | 111 | | | 801 | | 14 | | | | 3 | | | 1 |
| Streptomycin | | | 47 | | | | 306 | | | 145 | | | 924 | | 25 | | | | 3 | | | 1 | | |
| Cephalosporine B1 C | | Cefalonium | | | | | | 13 | | | 3 | | | 124 | | 3 | | | | 1 | | | | |
| | | Cefazolin | | | | | | 12 | | | 3 | | | 124 | | 3 | | | | 1 | | | | |
| | | Cefoperazon | | | | | | 13 | | | 3 | | | 125 | | 3 | | | | 1 | | | | |
| | | Cefquinom | | | 21 | | | | 169 | | | 44 | | | 316 | | 14 | 1 | | 2 | | | | |
| | | Ceftiofur | | | 22 | | | | 154 | | | 52 | | | 939 | | 18 | 2 | | 1 | | | | |
| | | Cephalexin Anhydrat | | | 9 | | | | 168 | | | 44 | | | 315 | | 14 | | | 1 | | | | |
| | | Cephapirin | | | 21 | | | | 117 | | | 32 | | | 259 | | 14 | 1 | | 2 | | | | |
| Penicilline | B1 D | Amoxicillin | | | 37 | | 1 | | 307 | | 3 | | | 896 | | 48 | | 5 | | 9 | | | 1 | |
| | | Ampicillin | | | 56 | | 1 | | 331 | | 3 | | | 1.131 | | 50 | | 7 | | 11 | | | 1 | |
| | | Benzylpenicillin | | | 56 | | 1 | | 331 | 1 | 3 | | 82 | 1 | 1.132 | 1 | 50 | | 7 | | 11 | | 1 | |
| | | Cloxacillin | | | 54 | | 1 | | 332 | | 3 | | | 1.341 | | 52 | | 8 | | 11 | | | | |
| | | Dicloxacillin | | | 54 | | 1 | | 332 | | 3 | | | 1.326 | | 52 | | 8 | | 11 | | | | |
| | | Methicillin | | | 1 | | | | 37 | | | 4 | | | 92 | | 5 | | | 3 | | | | |
| | | Nafcillin | | | 44 | | 1 | | 296 | | 3 | | | 777 | | 49 | | 6 | | 11 | | | | |
| | | Oxacillin | | | 54 | | 1 | | 332 | | 3 | | | 1.341 | | 52 | | 8 | | 11 | | | | |
| Phenoxymethylpenicillin | | | 30 | | 1 | | 211 | | 3 | | | 745 | | 41 | | 6 | | 10 | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---|--------------|--|--|------|-------------|-----|------------|-----|-----|-----|------|----|-------|-------|----------|-------|-----|----|-------------------|---|--------|----|----------------|---|--------|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Chinolone | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I B1 E | Ciprofloxacin | | | 105 | | 1 | | 615 | | 3 | | 202 | | 3.580 | | 69 | | 7 | | 10 | | 7 | | |
| | | | Danofloxacin | | | 132 | | 1 | | 725 | | 3 | | 224 | | 4.297 | | 74 | | 8 | | 10 | | 7 | | |
| | | | Difloxacin | | | 119 | | 1 | | 682 | | 3 | | 205 | | 4.012 | | 74 | | 8 | | 10 | | 7 | | |
| | | | Enrofloxacin | | | 112 | | 1 | | 635 | | 3 | | 202 | | 3.667 | 2 | 71 | | 7 | | 12 | | 7 | | |
| | | | Enrofloxacin und Ciprofloxacin, Summe | | | 79 | | | | 579 | | | | 166 | | 2.978 | 2 | 32 | | 2 | | 7 | | 6 | | |
| | | | Flumequin | | | 120 | | 1 | | 692 | | 3 | | 208 | | 4.017 | | 74 | | 8 | | 10 | | 7 | | |
| | | | Levofloxacin | | | | | | | 2 | | | | 46 | | 46 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | Marbofloxacin | | | 132 | | 1 | | 725 | | 3 | | 224 | | 4.297 | | 74 | | 8 | | 12 | | 7 | | |
| | | | Nalidixinsäure | | | 63 | | 1 | | 286 | | 3 | | 134 | | 2.806 | | 50 | | 6 | | 2 | | 3 | | |
| | | | Norfloxacine | | | 46 | | 1 | | 184 | | 3 | | 101 | | 2.244 | | 38 | | 6 | | 1 | | 1 | | |
| | | | Ofloxacin | | | 13 | | | | 73 | | | | 49 | | 1.202 | | 6 | | 2 | | | | | | |
| | | | Oxolinsäure | | | 104 | | 1 | | 637 | | 3 | | 208 | | 3.803 | | 71 | | 8 | | 3 | | 7 | | |
| | | | Sarafloxacin | | | 85 | | 1 | | 322 | | 3 | | 151 | | 3.295 | | 51 | | 8 | | 3 | | 3 | | |
| | | | Diamino- pyrimidine | B1 F | Baquiloprim | | | 13 | | | 70 | | | | 49 | | 946 | | 5 | | 2 | | | | | |
| Trimethoprim | | | | | 56 | | 1 | | 236 | | 3 | | 81 | | 1.793 | 1 | 51 | | 8 | | 10 | | 2 | | | |
| Linkosamide | B1 H | Clindamycin | | | 23 | | | 106 | | | | 65 | | 1.214 | | 11 | | 2 | | 3 | | | | | | |
| | | Lincomycin | | | 50 | | 1 | | 192 | | 3 | | 84 | | 1.739 | | 40 | | 7 | | 4 | | 1 | | | |
| | | Pirlimycin | | | 23 | | | | 119 | | | | 66 | | 1.303 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | |
| Macrolide | B1 I | 3-O-Acetytylosin | | | | | | 4 | | | | | | 40 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Azithromycin | | | 17 | | 1 | | 41 | | 3 | | 2 | | 172 | | 28 | | 5 | | 1 | | | | | |
| | | Clarithromycin | | | 5 | | 1 | | 76 | | 3 | | 28 | | 428 | | 32 | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | Erythromycin | | | 32 | | 1 | | 226 | | 3 | | 81 | | 2.087 | | 50 | | 7 | | 5 | | | | | |
| | | Josamycin | | | 30 | | 1 | | 133 | | 3 | | 52 | | 1.648 | | 41 | | 7 | | 4 | | | | | |
| | | Oleandomycin | | | 30 | | 1 | | 141 | | 3 | | 52 | | 1.937 | | 41 | | 7 | | 5 | | | | | |
| | | Roxithromycin | | | | | | | 8 | | | | | | 46 | | 3 | | | | 1 | | | | | |
| | | Spiramycin | | | 30 | | 1 | | 141 | | 3 | | 52 | | 1.993 | | 41 | | 7 | | 5 | | | | | |
| | | Josamycin | | | | | | | 27 | | | | 26 | | 264 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Spiramycin und Neospiramycin; Summe | | | | | | | 27 | | | | 26 | | 264 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Tilmicosin | | | 45 | | 1 | | 260 | | 3 | | 100 | | 2.447 | | 50 | | 7 | | 5 | | 1 | | | |
| | | Tulathromycin | | | 28 | | | | 210 | | | | 95 | | 1.992 | | 22 | | 2 | | 3 | | 1 | | | |
| | | Tylosin | | | 43 | | 1 | | 176 | | 3 | | 81 | | 2.391 | | 42 | | 8 | | 5 | | 1 | | | |
| Acetylisovaleryltylosin | | | 25 | | | | 93 | | | | 50 | | 1.071 | | 9 | | 3 | | 2 | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---|--------------|---------------------------|--|---|----|-----|------------|-----|----|----|------|-----|-------|---|----------|---|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB/SB | P | EB/SB | P | EB/SB | P | EB/ eV | P |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Sulfonamide | B1 L Phthalylsulfathiazol | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Succinylsulfathiazol | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfabenzamid | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfacetamid | | | 1 | | | 49 | | | | | | | 98 | | 11 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | Sulfachlorpyrazin | | | 35 | | 1 | 168 | | 3 | | 66 | | | 1.297 | | 48 | | 9 | | 4 | | 1 | | 1 | |
| | | Sulfachlorpyridazin | | | 23 | | 1 | 167 | | 3 | | 66 | | | 1.296 | | 48 | | 8 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| | | Sulfadiazin | | | 86 | | 1 | 523 | | 3 | | 167 | | | 3.176 | | 82 | | 16 | | 11 | | 6 | | 6 | |
| | | Sulfadimethoxin | | | 86 | | 1 | 523 | | 3 | | 167 | | | 3.175 | | 82 | | 16 | | 11 | | 6 | | 6 | |
| | | Sulfadimidin | | | 86 | | 1 | 523 | | 3 | | 167 | | | 3.177 | 2 | 82 | | 16 | | 11 | | 6 | | 6 | |
| | | Sulfadoxin | | | 86 | | 1 | 523 | | 3 | | 167 | | | 3.176 | | 82 | | 16 | | 11 | | 6 | | 6 | |
| | | Sulfaethoxypyridazin | | | 15 | | | 106 | | | | 49 | | | 974 | | 11 | | 3 | | | | | | | |
| | | Sulfaguanidin | | | 16 | | | 118 | | | | 53 | | | 1.132 | | 16 | | 4 | | 1 | | | | | |
| | | Sulfalen | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfamerazin | | | 74 | | 1 | 490 | | 3 | | 151 | | | 2.893 | | 82 | | 16 | | 11 | | 5 | | 5 | |
| | | Sulfameter | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfamethizol | | | 14 | | | 106 | | | | 49 | | | 972 | | 11 | | 3 | | | | | | | |
| | | Sulfamethoxazol | | | 74 | | 1 | 489 | | 3 | | 151 | | | 2.737 | | 82 | | 16 | | 11 | | 5 | | 5 | |
| | | Sulfamethoxy-pyridazin | | | 69 | | | 451 | | | | 149 | | | 2.800 | | 54 | | 12 | | 11 | | 5 | | 5 | |
| | | Sulfamonomethoxin | | | 13 | | | 51 | | | | 23 | | | 750 | | 7 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | | Sulfamoxol | | | 16 | | | 83 | | | | 27 | | | 845 | | 12 | | 4 | | | | | | | |
| | | Sulfanilamid | | | 34 | | 1 | 269 | | 3 | | 79 | | | 1.766 | | 60 | | 9 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| | | Sulfanitran | | | 1 | | | 71 | | | | 26 | | | 314 | | 10 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | Sulfaperin | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfaphenazol | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfapyrazol | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfapyridin | | | 16 | | | 119 | | | | 53 | | | 1.288 | | 16 | | 4 | | 3 | | | | | |
| | | Sulfaquinoxalin | | | 35 | | 1 | 168 | | 3 | | 66 | | | 1.313 | | 48 | | 9 | | 4 | | 1 | | 1 | |
| | | Sulfathiazol | | | 74 | | 1 | 490 | | 3 | | 151 | | | 2.893 | | 82 | | 16 | | 11 | | 5 | | 5 | |
| | | Sulfatolamid | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| | | Sulfatroxazol | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | |
| Sulfisomidin | | | 1 | | | 36 | | | | | | | 27 | | 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| Sulfisoxazol | | | 16 | | | 118 | | | | 53 | | | 1.132 | | 16 | | 4 | | 1 | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | |
|---|-----------------|-------------|--|---|-------------|-------|------------|----|----|---|--------|---|-----|---|----------|-----|----|----|-------------------|-----|--------|---|----------------|---|--------|---|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | |
| | | | EB | P | N | P | EB | P | N | P | EB | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Tetracycline | B1 M | Chlortetracyclin | | | 82 | | | 1 | | 370 | | | 3 | | 143 | | | 2.418 | | 66 | | 12 | | 4 | | 3 |
| | | | Chlortetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | | | 79 | | | 1 | | 734 | | | 3 | | 221 | | | 3.056 | | 82 | | 10 | | 10 | | 7 |
| | | | Doxycyclin | | | 131 | | | 1 | | 935 | | | 3 | | 285 | | | 4.089 | | 100 | | 16 | | 11 | | 7 |
| | | | Epi-Chlortetracyclin | | | 25 | | | | | 98 | | | | | 74 | | | 650 | | 9 | | 2 | | | | 1 |
| | | | Epi-Oxytetracyclin | | | 25 | | | | | 97 | | | | | 74 | | | 649 | | 9 | | 2 | | | | 1 |
| | | | Epi-Tetracyclin | | | 25 | | | | | 125 | | | | 1 | 101 | | | 891 | | 10 | | 2 | | | | 1 |
| | | | Minocyclin | | | | | | | | 27 | | | | | 26 | | | 241 | | 1 | | | | | | |
| | | | Oxytetracyclin | | | 93 | | | 1 | | 407 | | | | 3 | 160 | | | 2.952 | 1 | 68 | | 13 | | 4 | | 3 |
| | | | Oxytetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | | | 68 | | | 1 | | 697 | | | | 3 | 204 | | | 2.482 | 1 | 80 | | 9 | | 10 | | 7 |
| | | | Rolitetracyclin | | | 4 | | | | | 89 | | | | | 1 | | | 280 | | 9 | | 1 | | | | |
| | | | Tetracyclin | | | 82 | | | 1 | | 343 | | | | 3 | 118 | 1 | | 2.176 | | 65 | | 12 | | 4 | | 3 |
| | | | Tetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | | | 79 | | | 1 | | 735 | | | | 3 | 221 | 1 | | 3.017 | 2 | 82 | | 10 | | 10 | | 7 |
| | | Amphenicole | B1 N | | Florfenicol | 4 | | 20 | | | 51 | | 111 | | | 28 | | 49 | | 13 | 885 | | 36 | | 3 | | |
| | Florfenicolamin | | | | | 14 | | | 1 | | 54 | | | 1 | | 35 | | | 727 | | 5 | | 2 | | | | |
| | Thiamphenicol | | | 4 | | 18 | | | 51 | | 74 | | | | 28 | | 35 | | 13 | 807 | | 9 | | 3 | | | 1 |
| Pleuromutiline | B1 O | | Tiamulin | | | 30 | | | 1 | | 172 | | | 3 | | 51 | | | 1.431 | | 40 | | 8 | | 2 | | |
| | | | Tiamulin, Summe aller Metaboliten, die zu 8-alpha- hydroxymutilin hydrolysiert | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | |
| sonst. Stoffe mit antibakt. Wirkung | B1P | | Avilamycin | | | 12 | | | | | 37 | | | | | 17 | | | 540 | | 2 | | 1 | | | | |
| | | | Avilamycin A | | | 1 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | 163 | | 2 | | 1 | | | | |
| Hemmstoffe | B1 | | Hemmstofftest | | | 4.973 | 20 | | | | 10.345 | 8 | | | 1.564 | 18 | | | 274.870 | 385 | 2.621 | 4 | 84 | 3 | 8 | 5 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|--|-----------------------|---|--------|---|----|---|------------|---|-----|---|------|---|----|-----|----------|-----|----|----|-------------------|---|--------|---|----------------|----|--------|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Anthelminthika B2a | 22, 23-Dihydroavermectin B1a | | | 12 | | | | 71 | | | | 30 | | | 286 | | 3 | | 5 | | 1 | | 10 | | |
| | | 5-Hydroxy-Thiabendazol | | | 4 | | | | 64 | | | | 29 | | | 130 | | 4 | | 4 | | | | 7 | | |
| | | Abamectin | | | 7 | | | | 21 | | | | 8 | | | 155 | | 1 | | 3 | | | | | | |
| | | Albendazol | 1 | | 16 | | 20 | | 124 | | 25 | | 48 | | 10 | 468 | 1 | 34 | | 6 | | 1 | | 8 | | |
| | | Albendazol-2-aminosulfon | | | 15 | | | | 89 | | | | 40 | | | 367 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | |
| | | Albendazolsulfon | | | 15 | | | | 89 | | | | 40 | | | 367 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | |
| | | Albendazolsulfoxid | | | 15 | | | | 89 | | | | 40 | | | 367 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | |
| | | Albendazoloxid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon | 1 | | 17 | | 15 | | 126 | | 22 | | 52 | | 9 | 449 | | 32 | | 7 | | | | 8 | | |
| | | Aminoflubendazol | | | 20 | | | | 113 | | | | 49 | | | 510 | 1 | 5 | | 5 | | | | 8 | | |
| | | Aminomebendazol | | | 8 | | | | 80 | | | | 33 | | | 256 | | 5 | | 5 | | | | 7 | | |
| | | Avermectin B 1 a | 1 | | 15 | | 19 | | 131 | | 25 | | 47 | | 10 | 406 | | 32 | | 7 | | 1 | | 14 | | |
| | | Cambendazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Closantel | | | 2 | | | | 33 | | | | 19 | | | 67 | | 1 | | 2 | | | | 6 | | |
| | | Doramectin | 1 | | 16 | | 20 | | 140 | | 26 | | 51 | | 10 | 457 | | 34 | | 8 | | 1 | | 14 | | |
| | | Emamectin B1a | 1 | | 4 | | 20 | | 66 | | 26 | | 31 | | 10 | 135 | | 28 | | 1 | | | | 7 | | |
| | | Emamectin B1a/B1b | | | 1 | | | | 7 | | | | | | | 41 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | Eprinomectin | 1 | | 10 | | 20 | | 74 | | 26 | | 22 | | 10 | 240 | | 29 | | 5 | | | | 2 | | |
| | | Eprinomectin B1a | | | 12 | | | | 79 | | | | 34 | | | 328 | | 5 | | 5 | | 1 | | 12 | | |
| | | Febantel | | | 7 | | | | 9 | | | | 7 | | | 114 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Fenbendazol | 1 | | 17 | | 20 | | 134 | | 26 | | 54 | | 10 | 493 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | | | | |
| Flubendazol | | | 15 | | | | 89 | | | | 40 | | | 367 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | | |
| Flubendazol und Aminoflubendazol, Summe | 1 | | 17 | | 20 | | 126 | | 26 | | 52 | | 10 | 475 | 1 | 32 | | 7 | | | | 8 | | | | |
| Hydroxymebendazol | | | 8 | | | | 80 | | | | 33 | | | 256 | | 5 | | 5 | | | | 7 | | | | |
| Ivermectin | 1 | | 10 | | 20 | | 85 | | 26 | | 31 | | 10 | 290 | | 31 | | 5 | | | | 4 | | | | |
| Ketotriclabendazol | | | 3 | | | | 52 | | | | 23 | | | 99 | | 3 | | 3 | | | | 7 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--------|---|----|---|------------|---|-----|---|------|---|----|---|----------|----|-----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Anthelminthika B2a | Levamisol | 1 | | 17 | | 20 | | 137 | | 26 | | 54 | | 10 | | 521 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Mebendazol | 1 | | 17 | | 20 | | 134 | | 26 | | 54 | | 10 | | 493 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Mebendazol, Methyl-(5-(1- hydroxy,1phenyl)methyl-1H- benzimidazol-2-yl) | 1 | | 17 | | 15 | | 126 | | 22 | | 52 | | 9 | | 449 | | 32 | | 7 | | | | 8 | |
| | | Morantel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Moxidectin | 1 | | 16 | | 20 | | 140 | | 26 | | 51 | | 10 | | 457 | | 34 | | 8 | | 1 | | 14 | |
| | | Netobimin | | | 7 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 114 | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | Nitroxinil | | | 2 | | | | 36 | | | | 19 | | | | 74 | | 1 | | 2 | | | | 6 | |
| | | Oxfendazol | 1 | | 17 | | 20 | | 134 | | 26 | | 54 | | 10 | | 493 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Oxfendazol-sulfon | | | 8 | | | | 80 | | | | 33 | | | | 256 | | 5 | | 5 | | | | 7 | |
| | | Oxibendazol | 1 | | 17 | | 20 | | 137 | | 26 | | 54 | | 10 | | 521 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Oxyclozanid | | | | | | | 3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | Rafoxanid | | | 2 | | | | 33 | | | | 19 | | | | 67 | | 1 | | 2 | | | | 6 | |
| | | Selamectin | 1 | | 2 | | 20 | | 37 | | 26 | | 14 | | 10 | | 80 | | 27 | | 1 | | | | 1 | |
| | | Summe aller extrahierbaren Rückstände, die zu Oxfendazolsulfon | 1 | | 17 | | 15 | | 134 | | 22 | | 52 | | 9 | | 495 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Ketotriclabendazol, Summe | 1 | | 9 | | 15 | | 103 | | 22 | | 39 | | 9 | | 333 | | 31 | | 5 | | | | 8 | |
| | | Thiabendazol | 1 | | 13 | | 20 | | 111 | | 26 | | 50 | | 10 | | 349 | | 31 | | 6 | | | | 8 | |
| | | Thiabendazol, Summe | 1 | | 17 | | 15 | | 134 | | 22 | | 52 | | 9 | | 521 | | 35 | | 7 | | 1 | | 8 | |
| | | Triclabendazol | 1 | | 16 | | 20 | | 121 | | 26 | | 48 | | 10 | | 462 | | 34 | | 6 | | 1 | | 8 | |
| | | Triclabendazolsulfon | | | 8 | | | | 80 | | | | 33 | | | | 256 | | 5 | | 5 | | | | 7 | |
| | | Triladabenzolsulfoxid | | | 8 | | | | 80 | | | | 33 | | | | 256 | | 5 | | 5 | | | | 7 | |
| Kokzidiostatika | B2b 1 | Amprolium | | | | | | 2 | | | | | | | | 10 | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | | Arprinocid | | | 29 | | | | 161 | | | | 80 | | | | 319 | | 8 | | 5 | | 7 | | 6 | |
| | | Clazuril | | | | | | | 2 | | | | | | | | 10 | | 1 | | | | | 1 | | |
| | | Decoquinat | | | 28 | | | | 142 | | | | 69 | | | | 322 | | 15 | | 4 | | 7 | | 5 | |
| | | Diclazuril | | | 28 | | | | 145 | | | | 72 | | | | 329 | | 15 | | 4 | | 7 | | 5 | |
| | | Dinitolmid DOT | | | 29 | | | | 161 | | | | 80 | | | | 319 | | 8 | | 5 | | 7 | | 6 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|---|----|----|------------|-----|----|-----|------|----|----|-----|----------|-------|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|------|---|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Kokzidiostatika | B2b 1 Dinitrocarbanilid (DNC) | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| | | Ethopabat | | | | | | 16 | | | | 2 | | | | 36 | | | 9 | | | | | | | 1 | |
| | | Halofuginon | | | 4 | | | 178 | | | | 85 | | | | 324 | | | 16 | | 6 | | | 8 | | 6 | |
| | | Laidlomycin propionat | | | 28 | | | 150 | | | | 78 | | | | 318 | | | 15 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Kalium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Laidlomycin propionat Kalium | | | 1 | | | 25 | | | | 4 | | | | 27 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Lasalocid | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Maduramicin | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Meticlorepindol | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Monensin | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Narasin | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Nicarbazin | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Robenidin | | | 28 | | | 145 | | | | 72 | | | | 329 | | | 15 | | 4 | | | 7 | | 5 | |
| | | Salinomycin | | | 29 | | | 179 | | | | 85 | | | | 381 | | | 16 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| | | Semduramicin | | | 41 | | | 162 | | | | 81 | | | | 316 | | | 7 | | 6 | | | 8 | | 5 | |
| | | Semduramicin-Na | | | | | | 33 | | | | 10 | | | | 51 | | | 9 | | | | | | | 1 | |
| | | Toltrazuril | | | 28 | | | 131 | | | | 70 | | | | 329 | | | 7 | | 4 | | | 7 | | 5 | |
| | | Toltrazurilsulfon | | | 27 | | | 136 | | | | 76 | | | | 347 | | | 7 | | 5 | | | 7 | | 6 | |
| Toltrazurilsulfoxid | | | 26 | | | 91 | | | | 57 | | | | 265 | | | 5 | | 4 | | | 5 | | 3 | | | |
| Nitroimidazole | B2b 2 | Ipronidazol | 27 | | 31 | | 204 | | | 167 | | 57 | | 64 | 522 | 3.692 | 16 | | 5 | | | | | | 2 | | |
| | | Ipronidazol-OH (Metabolit) | 26 | | 31 | | 203 | | | 165 | | 51 | | 63 | 511 | 3.666 | 14 | | 5 | | | | | | 2 | | |
| | | Ornidazol | | | 1 | | 17 | | | 8 | | 7 | | 1 | 26 | 97 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | | Secnidazol | | | 1 | | 17 | | | 8 | | 7 | | 1 | 26 | 99 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | | Ternidazol | | | 1 | | 17 | | | 10 | | 7 | | 1 | 26 | 162 | 3 | | | | | | | | 1 | | |
| | | Tinidazol | 3 | | 2 | | 37 | | | 30 | | 17 | | 17 | 97 | 570 | 2 | | | | | | | | 2 | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | |
|-----------------------------------|--------------|--|--------|---|----|---|------------|---|----|---|------|---|----|---|----------|---|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|----|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Pyrethroide | B2c 2 Etofenprox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 6 | | 13 | | 26 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 129 | | 19 | | 320 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | 3 | | 120 | | 16 | | 228 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | 5 | | 125 | | 29 | | 194 | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | 1 | | 11 | | 3 | | 8 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 8 | | | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 20 | | 13 | | 104 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | 16 | | 175 | | 46 | | 564 | | 7 | | 3 | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | | | | | 1 | | 15 | | 14 | | 127 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------|----|--|------------|----|--|------|-----|----|----------|----|----|----|-------------------|----|--------|----|----------------|-----|--------|-----|----|---|----|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Kälber | | | Mastrinder | | | Kühe | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | P | | EB | P | | EB | P | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | N | | | N | | | N | | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Beruhigungsmittel/ Sedativa | Acepromazin | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 84 | | | 38 | | | 12 | 20 | | | 1.502 | 44 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Azaperol | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 70 | | | 38 | | | 11 | 20 | | | 992 | 43 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Azaperon | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 70 | | | 38 | | | 11 | 20 | | | 1.278 | 43 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Carazolol | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 84 | | | 38 | | | 12 | 20 | | | 1.541 | 43 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Diazepam | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 1 | | | | 457 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Haloperidol | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 2 | | | | 902 | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Methapyrilen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oxazepam | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 1 | | | | 458 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promazin | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 49 | | | 38 | | | 10 | 20 | | | 74 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promethazin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Propionylpromazin | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 84 | | | 38 | | | 12 | 20 | | | 1.502 | 44 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xylazin | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 84 | | | 38 | | | 12 | 20 | | | 965 | 1 | 41 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSAIDs | B2e | 4-Acetylamino-Antipyrin | 1 | | | 8 | | | 6 | | | 57 | | | 38 | | | 13 | 20 | | | 105 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-Formylamino-Antipyrin | 1 | | | 8 | | | 6 | | | 50 | | | 38 | | | 13 | 20 | | | 102 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-Hydroxyantipyrin | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 49 | | | 38 | | | 10 | 20 | | | 63 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-Methylamino-Antipyrin 4-Methylaminophenazon | 1 | | | 43 | | | 6 | | | 204 | | | 38 | | | 81 | 1 | 20 | | | 793 | 53 | | | 15 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 5-Hydroxyflunixin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5-Hydroxyflunixinhydroxid | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 49 | | | 38 | | | 10 | 20 | | | 63 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acetaminophen | 1 | | | 7 | | | 6 | | | 49 | | | 38 | | | 10 | 20 | | | 63 | 38 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Paracetamol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aminopyrin Aminoantipyrin | 1 | | | 31 | | | 6 | | | 171 | | | 38 | | | 65 | 20 | | | 511 | 53 | | | 15 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | Aminophenazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dimethylaminophenazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampyron; 4-Amino-Antipyrin; 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-aminopyrazolon | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | 44 | | | | 668 | 11 | | | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Carprofen | 3 | | | 31 | | | 44 | | | 180 | | | 46 | | | 78 | 31 | | | 570 | 61 | | | 16 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---|-----|----|----|------------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|----------|-----|----|-------|-------------------|----|--------|----|----------------|---|------|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | |
| | | | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | eV | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | NSAIDs | B2e | Carprofen und Carprofen Glukoronidkonjugat, Summe | | | 1 | | | | 5 | | | | | 43 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | Diclofenac | 3 | | 30 | | 39 | | 180 | | 45 | | 76 | | 26 | | 549 | | 60 | | 16 | | 1 | 4 | |
| | | | Dipyron Metamizol Anhydrat | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | Firocoxib | | | 12 | | 46 | | 16 | | | | 16 | | | | 233 | | 8 | | 3 | | 1 | 1 | |
| | | | Flufenaminsäure | 1 | | 20 | | 6 | | 115 | | 38 | | 47 | | 20 | | 332 | | 48 | | 10 | | 1 | 2 | |
| | | | Flunixin | | | | | 16 | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| | | | Flunixin Meglumin | 3 | | 43 | | 45 | | 200 | | 46 | | 90 | | 31 | | 856 | | 61 | | 16 | | 1 | 4 | |
| | | | Flurbiprofen | | | 12 | | 46 | | 16 | | | | 16 | | | | 233 | | 8 | | 3 | | 1 | 1 | |
| | | | Ibuprofen | 1 | | 9 | | 6 | | 89 | | 38 | | 36 | | 20 | | 127 | | 45 | | 8 | | | 1 | |
| | | | Ketoprofen | 1 | | 21 | | 6 | | 135 | | 38 | | 52 | | 20 | | 360 | | 53 | | 11 | | 1 | 2 | |
| | | | Meclofenaminsäure | | | 2 | | 40 | | 26 | | | | 26 | | | | 64 | | 7 | | 2 | | | 1 | |
| | | | Mefenaminsäure | 1 | | 21 | | 6 | | 142 | | 44 | | 52 | | 20 | | 374 | | 53 | | 11 | | 1 | 2 | |
| | | | Meloxicam | 3 | | 43 | | 45 | | 216 | | 46 | | 94 | | 31 | | 856 | | 61 | | 16 | | 1 | 5 | |
| | | | Metamizol (freie Säure) | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 29 | | 1 | | | | | | |
| | | | Dipyron Noramidopyrin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Naproxen | 1 | | 21 | | 6 | | 135 | | 38 | | 52 | | 20 | | 360 | | 53 | | 11 | | 1 | 2 | |
| | | | Niflumininsäure | 1 | | 20 | | 6 | | 122 | | 44 | | 47 | | 20 | | 346 | | 48 | | 10 | | 1 | 2 | |
| | | | Oxyphenbutazon Anhydrat | 4 | | 6 | | 105 | | 114 | | 36 | | 63 | | 42 | | 170 | | 16 | | 3 | | | 2 | |
| | | | Oxyphenbutazon Monohydrat | 2 | | 18 | | 41 | | 96 | | 38 | | 25 | | 29 | | 326 | | 47 | | 9 | | 1 | 1 | |
| | | | Phenazon | 1 | | 16 | | 6 | | 69 | | 38 | | 22 | | 20 | | 214 | | 40 | | 9 | | | | |
| | | | Phenylbutazon | 192 | | 75 | | 688 | | 528 | | 392 | | 251 | | 536 | | 1.623 | | 88 | | 19 | | 1 | 3 | |
| | | | Piroxicam | | | 12 | | 46 | | 16 | | | | 16 | | | | 233 | | 8 | | 3 | | 1 | 1 | |
| | | | Propyphenazon | | | 13 | | 54 | | 6 | | | | 19 | | | | 286 | | 8 | | 3 | | 1 | 1 | |
| | | | Ramifenazon Isopyrin | 1 | | 31 | | 6 | | 171 | | 38 | | 65 | | 20 | | 511 | | 53 | | 15 | | 1 | 1 | |
| | | | Salicylsäure | 1 | | 7 | | 6 | | 49 | | 38 | | 10 | | 20 | | 63 | | 38 | | 6 | | | | |
| | | | Suxibuzon | | | 12 | | 46 | | 16 | | | | 16 | | | | 233 | | 8 | | 3 | | 1 | 1 | |
| | | | Tolfenamensäure | 3 | | 31 | | 45 | | 183 | | 46 | | 78 | | 31 | | 574 | | 61 | | 16 | | 1 | 4 | |
| | | | Vedaprofen | 3 | | 31 | | 45 | | 183 | | 46 | | 78 | | 31 | | 577 | | 61 | | 16 | | 1 | 4 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---|--|---|--------|---|----|---|------------|----|-----|----|------|-----|----|-----|----------|----|----|----|-------------------|---|--------|---|----------------|---|------|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/eV | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Sonstige Stoffe mit antibakterieller und zugleich antiprotozoischer Wirkung | B2f 1 Clorsulon | | | 13 | | | 43 | | | 23 | | | 704 | | | 4 | | 2 | | | | | | | |
| | | Praziquantel | | | 2 | | | 35 | | | 20 | | | 67 | | | 1 | | 2 | | | | 6 | | | |
| Sonstige Ektoparasitika | B2f 2 | Amitraz | | | | | 8 | | | 1 | | | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Amitraz, Gesamt-, einschließlich aller Metaboliten, die die Cymiazol Diflubenzuron Teflubenzuron | | | | | 8 | | | 1 | | | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Synthetische Kortikosteroide | B2f 3 | Betamethason | 1 | | 74 | | 6 | | 375 | 38 | | 305 | 20 | | 430 | | 69 | | 10 | | 1 | | | | | |
| | | Dexamethason | 1 | | 86 | | 6 | | 419 | 38 | | 325 | 6 | 20 | 727 | | 69 | | 10 | | 1 | 1 | | | | |
| | | Flumethason | 1 | | 31 | | 6 | | 272 | 38 | | 77 | 20 | 288 | | 58 | | 7 | | | | | | | | |
| | | Methylprednisolon | 1 | | 73 | | 6 | | 371 | 38 | | 304 | 20 | 401 | | 68 | | 10 | | 1 | | | | | | |
| | | Prednisolon | 1 | | 74 | | 6 | | 386 | 38 | | 305 | 20 | 445 | | 69 | | 10 | | 1 | | | | | | |
| | | Triamcinolon | 1 | | 9 | | 6 | | 59 | 38 | | 26 | 20 | 105 | | 42 | | 6 | | | | | | | | |
| | | Triamcinolonacetonid | | | 18 | | | | 127 | | | 7 | | 140 | | 12 | | 1 | | | | | | | | |
| Sonstige Stoffe mit pharmakolog. Wirkung | B2f 4 | Cotinin, Metabolit von Nikotin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metoprolol Nikotin | 5 | | 12 | | 36 | | 23 | 4 | | | 10 | | 110 | | 4 | | | | | 1 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | | | |
|---|---|--|--|--------|----|----|------------|---|----|-----|------|-----|----|---|----------|---|----|-------|-------------------|-------|--------|----|----------------|---|--------|---|-----|-----|-----|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | organische Chlorverb., einschl. PCB | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | B3a | Aldrin | | | 29 | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 954 | | 21 | | 6 | | 2 | | 102 | | |
| | | | alpha(cis)-Chlordan | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | 110 | | |
| | | | alpha-Endosulfan | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 955 | | 21 | | 6 | | 2 | | 108 | | |
| | | | alpha-HCH | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 955 | | 21 | | 6 | | 2 | | 108 | | |
| | | | beta-Endosulfan | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 955 | | 21 | | 6 | | 2 | | 108 | | |
| | | | beta-HCH | | | 29 | | | | | | 236 | | | | | 76 | | | 1.013 | | 21 | | 6 | | 2 | | 109 | | |
| | | | Bromocyclen | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | 108 | | |
| | | | Brompropylat | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | Chinomethionat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Chlorbenzilat | | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | 12 | | 6 | | | | | | | 4 | |
| | | | Chlordan, Summe | | | 14 | | | | | | 39 | | | | | 15 | | | 475 | | 3 | | 3 | | | | | 23 | |
| | | | Chlordan und Oxychlordan, Summe aus alpha(cis)- u. gamma(trans)- Chlordan und | | | 21 | | | | | | 199 | | | | | 59 | | | 724 | | 19 | | 5 | | 1 | | | 82 | |
| | | | Chlorpropylat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | cis-Heptachlorepoxid | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | | 110 | |
| | | | cis-Nonachlor | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | 11 | | | 116 | | | | | | | | | 11 | |
| | | | DDT, Summe | | | 20 | | | | | | 220 | | | | | 60 | | | 935 | | 19 | | 5 | | 1 | | | 104 | |
| | | | delta-HCH | | | 28 | | | | | | 220 | | | | | 67 | | | 934 | | 15 | | 6 | | 2 | | | 80 | |
| | | | Delta-Ketoendrin | | | 28 | | | | | | 204 | | | | | 76 | | | 879 | | 18 | | 6 | | 2 | | | 87 | |
| | | | Dicamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dieldrin | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | | 110 | |
| | Dieldrin, Summe | | | 19 | | | | | | 185 | | | | | 59 | | | 804 | | 16 | | 5 | | 1 | | | 77 | | | |
| | Endosulfan-sulfat | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | | 110 | | | |
| | Endosulfan, Summe | | | 20 | | | | | | 210 | | | | | 59 | | | 816 | | 19 | | 5 | | 1 | | | 85 | | | |
| | Endrin | | | 29 | | | | | | 239 | | | | | 76 | | | 1.021 | | 21 | | 6 | | 2 | | | 110 | | | |
| | Endrin, Summe | | | 18 | | | | | | 139 | | | | | 45 | | | 597 | | 12 | | 4 | | | | | 55 | | | |
| | epsilon-HCH | | | 3 | | | | | | 109 | | | | | 21 | | | 240 | | 3 | | 1 | | | | | 29 | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|----|---|------------|---|----|---|------|---|----|---|----------|---|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|------|----|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB/SB | P | EB/SB | P | EB/SB | P | EB/ | eV |
| N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | P | |
| Andere Stoffe und Kontaminanten | organische Chlorverb., einschl. PCB | B3a nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (WHO-TEF 2005) upper bound | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 1997) upper bound | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) lower bound | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) medium bound | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) upper bound | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,7,8-PeCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,2,3,7,8-PeCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,3,4,7,8-PeCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,3,7,8-TeCDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,3,7,8-TeCDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | |
|---|---|--|--------|---|---|---|------------|---|---|---|------|---|---|---|----------|---|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|--|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | |
| | | | EB | P | N | P | EB | P | N | P | EB | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Organische Phosphorverbin- dungen | B3b Spinosad, Summe aus Spinosyn A und Spinosyn D, ausgedrückt als Spinosad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tetrachlorvinphos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Thiamethoxam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Thiamethoxam, Summe aus Thiamethoxam und Clothianidin, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Thiometon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Triazophos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Trichlorfon; Metrifonat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chemische Elemente | B3c | Aluminium Al | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Antimon Sb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Arsen As, gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Blei Pb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cadmium Cd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Calcium Ca Kalzium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Chrom Cr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cobalt Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eisen Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kalium K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kupfer Cu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Magnesium Mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mangan Mn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Natrium Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nickel Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quecksilber Hg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Selen Se | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strontium Sr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thallium Tl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zink Zn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---|--------------|-------------------------------|--------|---|----|---|------------|---|-----|---|------|----|----|---|----------|-----|-----|----|-------------------|---|--------|---|----------------|----|------|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | |
| | | | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Mykotoxine | B3d Aflatoxin B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aflatoxin M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | alpha-Zearalenol | 25 | | 32 | | 141 | | 156 | | 68 | | 65 | | 63 | | 568 | | 18 | | 8 | | 1 | | 3 | |
| | | beta-Zearalenol | 25 | | 32 | | 141 | | 156 | | 68 | | 65 | | 63 | | 568 | | 18 | | 8 | | 1 | | 3 | |
| | | Ochratoxin A | | | | | | | 1 | | | | | | | | 162 | | | | 3 | | | | | |
| | | Zearalenon; Mycotoxin F | 25 | | 32 | | 139 | | 162 | | 65 | | 72 | | 62 | | 550 | | 19 | | 8 | | 1 | 3 | | |
| Farbstoffe | B3e | Brillantgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Malachitgrün G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI 42040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Brillantgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Kristallviolett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Malachitgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kristallviolett; Basic Violet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 CI 42555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leukokristallviolett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leukomalachitgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Malachitgrün CI 42000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sonstige | B3f | Boscalid; Nicobifen | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | |
| | | Dimethomorph | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fenpropimorph | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fluazifop-butyl | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fluazifop, freie Säure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fluazifop-P-Butyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Moschus-Ambrette | | | | | 8 | | | | | | | | | 155 | | | | | | | | 2 | | |
| | | Moschus-Keton | | | 19 | | 18 | | | | | 53 | | | | 697 | | 10 | | 5 | | 1 | | 73 | | |
| | | Moschus-Musken | | | | | 8 | | | | | | | | | 155 | | | | | | | | 2 | | |
| | | Moschus-Tibeten | | | | | 8 | | | | | | | | | 155 | | | | | | | | 2 | | |
| | | Moschus-Xylol | | | 19 | | 18 | | | | | 53 | | | | 697 | | 10 | | 5 | | 1 | | 73 | | |
| | | N,N-Diethyl-m-toluamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | |
|---|--------------|--|--------|---|----|---|------------|---|----|---|------|---|----|---|----------|---|----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|--|--|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Amide | B3f1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acetamiprid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dimoxystrobin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flutolanil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Iprodion; Glyphen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metazachlor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tebufenpyrad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zoxamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azole | B3f3 | Bromuconazol, Gesamt-, Summe der Diastereoisomeren, ausgedrückt als Bromuconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cyproconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Difenoconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Epoxiconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fenbuconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fipronil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fipronil-sulfon (MB46136) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fluquinconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flusilazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flutriafol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hexaconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Myclobutanil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Paclobutrazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Propiconazol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | | | | | |
|---|---|--|--------|---|----|---|------------|---|----|---|------|---|----|----|----------|----|----|----|-------------------|-------|--------|--------|----------------|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | EB | SB | EB | SB | EB/SB | EB/SB | EB/SB | EB/ eV | | | | | | | | |
| | | | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | EB | P | SB | P | | | | | | | | | N | P | N | P | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | N | P | N | P |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | sonstige organische Stickstoffverbin- dungen | B3f20 Fenamidon | | | | | | | 8 | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fenhexamid | | | | | | | 8 | | | | | | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fenpropidin | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Fluoxastrobin | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Hexythiazox | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Isoproturon | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Mepanipyrim | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Pyridat | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Pyriproxyfen | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Quinoxifen | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Organische Schwefelverbin- dungen | B3f21 Propargit | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Rinder | | | | | | | | | | | | Schweine | | | | Schafe/ Ziegen | | Pferde | | Ka- ninchen | | Wild | |
|---|--|---|--------|---|----|---|------------|---|-----|---|------|---|----|---|----------|---|-----|---|-------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|---|
| | | | Kälber | | | | Mastrinder | | | | Kühe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/SB | | EB/ eV | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | sonstige organische Verbindungen | B3f31 2,4,6-Tribromanilin | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | 2,4,6-Tribromanisol | | | 4 | | | | 137 | | | | 30 | | | | 219 | | 7 | | 2 | | 1 | | 30 | |
| | | BDE 100 2,2',4,4',6- Pentabromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | BDE 153 2,2',4,4',5,5'- Hexabromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | BDE 154 2,2',4,4',5,6- Hexabromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | BDE 28 2,4,4'- Tribromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | BDE 47 2,2',4,4'- Tetrabromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | BDE 99 2,2',4,4',5- Pentabromdiphenylether | | | 1 | | | | 31 | | | | 14 | | | | 69 | | 4 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| | | Famoxadone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Haloxyfop-Ethoxyethylester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Haloxyfop, freie Säure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Haloxyfop, Gesamt-, einschließlich Haloxyfop-R und die Konjugate von Haloxyfop-Methylester | | | | | | | 8 | | | | 1 | | | | 10 | | 1 | | | | | | | |
| | | Triclosan-methyl | | | 4 | | | | 137 | | | | 30 | | | | 219 | | 7 | | 2 | | 1 | | 30 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | Eier | Honig | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|--------|--------------|---------|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|---|----|---|----|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | Masthähnchen | | Lege-/ Suppenhühner | | Truthühner | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | son- stige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | EB N | P P | | | | | | | | | | | | |
| Stilbene | Stilbene | A 1 | Dienestrol | 60 | | 111 | | 5 | | 5 | | 65 | | 53 | | 8 | | 7 | | 19 | | 8 | | 1 | | | | | | |
| | | | Diethylstilbestrol | 60 | | 111 | | 5 | | 5 | | 65 | | 53 | | 8 | | 7 | | 19 | | 8 | | 1 | | | | | | |
| | | | Hexestrol | 60 | | 111 | | 5 | | 5 | | 65 | | 53 | | 8 | | 7 | | 19 | | 8 | | 1 | | | | | | |
| Thyreostatika | Thyreostatika | A 2 | 2-Benzimidazolethiol | | | 37 | | | | 1 | | 13 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tapazol | | | 123 | | | | 6 | | 1 | | 97 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | Methylthiouracil | | | 123 | | | | 6 | | 1 | | 97 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | Phenylthiouracil | | | 123 | | | | 6 | | 1 | | 97 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | Propylthiouracil | | | 123 | | | | 6 | | 1 | | 97 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | Thiouracil | | | 123 | | | | 6 | | 1 | | 97 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | Steroide | synthetische Androgene | A3 A | 16-beta-Hydroxystanozolol | 59 | | 100 | | 5 | | 5 | | 50 | | 50 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | |
| 17-alpha-Trenbolon | 62 | | | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | | |
| 17-beta-19-Nortestosteron | 62 | | | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 16 | | 8 | | | | | | |
| 17-alpha-Boldenon | 62 | | | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | | |
| 17-beta-Boldenon | 62 | | | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | | |
| Epinandrolon | 62 | | | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 16 | | 8 | | | | | | |
| Methylboldenon Dianabol | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Methyltestosteron | 62 | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
| Stanozolol | 62 | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 5 | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
| 17-beta-Trenbolon | 62 | | | 104 | | 5 | | 5 | | 59 | | 52 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 3 | | | | | | | | |
| synthetische Estrogene | A3 B | 17-alpha-Ethinylestradiol | | 62 | | 91 | | 5 | | 5 | | 59 | | 50 | | 9 | | 9 | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
| synthetische Gestagene | | A3 C | | Acetoxyprogesteron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlormadinonacetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delmadinonacetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flugeston-17-acetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medroxyprogesteronacetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megestrolacetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melengestrolacetat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------------|-----|-----|----|------------------------|-----|----|----|------------|---|----|---|--------------|---|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Steroide | natürliche Steroide | A3 D 17-beta-Estradiol 17-beta-Testosteron | 2 | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 8 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resorcyssäure- Lactone | A 4 | Taleranol | 52 | 115 | 6 | 5 | 57 | 43 | 5 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zearalanon | 52 | 115 | 6 | 5 | 57 | 43 | 5 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zeranol | 53 | 114 | 6 | 5 | 62 | 49 | 5 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beta- Agonisten | A 5 | Brombuterol | 143 | 163 | 4 | 5 | 252 | 100 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Carbuterol | 27 | 33 | | | 58 | 6 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Chlorbrombuterol | 65 | 60 | | 2 | 123 | 33 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cimaterol | 69 | 74 | | 2 | 139 | 34 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cimbuterol | 65 | 61 | | 2 | 111 | 21 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clenbuterol | 143 | 163 | 4 | 5 | 252 | 100 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clencyclohexerol | 46 | 41 | | | 75 | 14 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clenhexerol Hydrochlorid | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clenisopenterol | 32 | 24 | | | 66 | 7 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clenpenterol | 51 | 45 | | | 93 | 13 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clenproperol | 65 | 65 | | 2 | 123 | 34 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fenoterol | 46 | 41 | | | 75 | 14 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hydroxymethylclenbuterol | 32 | 29 | | | 66 | 8 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Isoxsuprin | 46 | 41 | | | 75 | 14 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mabuterol | 143 | 163 | 4 | 5 | 251 | 100 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mapenterol | 65 | 61 | | 2 | 111 | 21 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Orciprenalin | 10 | 8 | | | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pirbuterol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ractopamin | 50 | 43 | | | 101 | 26 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ritodrin | 24 | 27 | | | 22 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Salbutamol | 143 | 163 | 4 | 5 | 252 | 100 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmeterol, Terbutalin | 15 | 10 | | | 19 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulobuterol | 69 | 74 | | 2 | 139 | 34 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zilpaterol | 51 | 45 | | | 93 | 13 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49 | 43 | | | 101 | 26 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | |
|--|--------------|-----------------------|--|-----|------------------------|----|------------|-----|-----------|----|--------------|---------|----------|--------|-------|--------|----|--------|---|
| | | | Masthähnchen | | Lege-/ Suppenhühner | | Truthühner | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| Stoffe des Anhangs IV der VO (EWG) Nr 2377/1990 | Amphenicole | A6 A | Chloramphenicol | 452 | 832 | 33 | 42 | 476 | 395 | 24 | 53 | 40 | 16 | 4 | 1.122 | 37 | 29 | | |
| abgelöst durch Tabelle 2 der VO (EG) Nr. 37/2010 | Nitrofurane | A6 B | 1-Aminohydantoin (AHD) | 37 | 443 | 4 | 16 | 17 | 244 | 4 | 31 | 32 | 18 | 2 | | 94 | 15 | | |
| | | | 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazid | 90 | 419 | 5 | 17 | 105 | 244 | 6 | 23 | 30 | 16 | | | 82 | 4 | | |
| | | | 3-Amino-2-oxazolidinon (AOZ) | 38 | 455 | 4 | 17 | 17 | 244 | 4 | 31 | 32 | 18 | 2 | | 96 | 15 | | |
| | | | 5-Methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinon (AMOZ) | 38 | 455 | 4 | 17 | 17 | 244 | 4 | 31 | 32 | 18 | 2 | | 96 | 15 | | |
| | | | Furaltadon | 102 | | 5 | | 174 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | Furazolidon | 102 | | 5 | | 174 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | Nifursol | 50 | 20 | 4 | | 86 | | 8 | 5 | | 2 | | | | 3 | | |
| | | | Nitrofurantoin | 102 | | 5 | | 174 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | Nitrofurazon | 101 | | 5 | | 174 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | Semicarbazid (SEM) | 38 | 449 | 4 | 17 | 17 | 239 | 4 | 31 | 31 | 16 | 2 | | 92 | 15 | | |
| Nitroimidazole | A6 C | Dimetridazol | 448 | 810 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | 253 | 96 | | | | |
| | | Dimetridazol-OH HMMNI | 440 | 810 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | 253 | 96 | | | | |
| | | Metronidazol | 448 | 819 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | 253 | 96 | | | | |
| | | Metronidazol-OH | 440 | 820 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | 253 | 96 | | | | |
| | | Ronidazol | 448 | 810 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | 253 | 96 | | | | |
| Beruhigungsmittel/ Sedativa | A6 D | Chlorpromazin | | 7 | | | | | | | | | | 59 | | | | | |
| sonst. antib. wirks. Substanzen | A6 E | Dapson | 3 | 124 | | 4 | 3 | 4 | | | 7 | | 1 | 154 | 15 | 23 | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|---|-----|---|------------------------|---|----|---|------------|----|----|---|--------------|----|----|-------|----------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | son- stige | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Aminoglycoside B1 A | Aminosidin | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | Apramycin | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 18 | | | | |
| | | Dihydrostreptomycin | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 43 | | | | |
| | | Gentamicin | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | Kanamycin | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | Nemadectin | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | |
| | | Neomycin | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | Spectinomycin | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 20 | | | | |
| | | Streptomycin | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 91 | | | | |
| Cephalosporine B1 C | | Cefalonium | | | 45 | | | | | | | 7 | | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| | | Cefazolin | | | 45 | | | | | | | | 7 | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| | | Cefoperazon | | | 45 | | | | | | | | 7 | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| | | Cefquinom | | | 45 | | | 1 | | | 43 | | 7 | | 8 | | | 200 | | | | | | | | | |
| | | Ceftiofur | | | 54 | | | 5 | | | 45 | | 7 | | | | | 133 | | | | | | | | | |
| | | Cephalexin Anhydrat | | | 45 | | | 1 | | | 43 | | 7 | | | | | 199 | | | | | | | | | |
| | | Cephapirin | | | 45 | | | 1 | | | 43 | | 7 | | 8 | | | 129 | | | | | | | | | |
| Penicilline | B1 D | Amoxicillin | 4 | | 139 | | | 1 | | 3 | | 43 | | 7 | | 6 | | 1 | 339 | | 7 | | 16 | | | | |
| | | Ampicillin | 4 | | 139 | | | 5 | | 3 | | 45 | | 7 | | 14 | | 1 | 341 | | 7 | | 20 | | | | |
| | | Benzylpenicillin | 4 | | 139 | | | 5 | | 3 | | 45 | | 7 | | 14 | | 1 | 404 | 1 | 7 | | 20 | | | | |
| | | Cloxacillin | 4 | | 143 | | | 5 | | 3 | | 47 | | 7 | | 14 | | 1 | 395 | | 7 | | 20 | | | | |
| | | Dicloxacillin | 4 | | 143 | | | 5 | | 3 | | 47 | | 7 | | 14 | | 1 | 348 | | 7 | | 20 | | | | |
| | | Methicillin | 1 | | 54 | | | | | | | | 7 | | | | | 1 | 158 | | | | | | | | |
| | | Nafcillin | 4 | | 129 | | | 5 | | 3 | | 45 | | 7 | | 14 | | 1 | 347 | | 7 | | 20 | | | | |
| | | Oxacillin | 4 | | 143 | | | 5 | | 3 | | 47 | | 7 | | 14 | | 1 | 348 | | 7 | | 20 | | | | |
| | | Phenoxymethylpenicillin | 4 | | 129 | | | | | 3 | | 2 | | 7 | | 6 | | 1 | 324 | | 7 | | 20 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------|------------------------|----|----|----|------------|-----|-----|---|-----------|----|--------------|----|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masthähnchen | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | | | |
| | | | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | | EB | SB | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N | P |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Chinolone | B1 E | Ciprofloxacin | 3 | 573 | | | 20 | | 3 | 262 | | | 35 | | 25 | 8 | 3 | 234 | 69 | 58 | | | | | | | | |
| | | | Danofloxacin | 3 | 629 | | | 27 | | 3 | 282 | | | 41 | | 25 | 8 | 3 | 238 | 85 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Difloxacin | 3 | 610 | | | 27 | | 3 | 281 | | | 40 | | 25 | 8 | 3 | 219 | 80 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Enrofloxacin | 4 | 612 | | | 27 | | 3 | 282 | | | 41 | | 25 | 8 | 3 | 234 | 83 | 61 | | | | | | | | |
| | | | Enrofloxacin und Ciprofloxacin, Summe | | 185 | | | 1 | | | 85 | | | 18 | | 8 | 8 | 1 | 117 | 25 | 13 | | | | | | | | |
| | | | Flumequin | 3 | 619 | | | 27 | | 3 | 282 | | | 41 | | 34 | 16 | 4 | 223 | 85 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Levofloxacin | | 29 | | | | | | 9 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Marbofloxacin | 3 | 590 | | | 20 | | 3 | 261 | | | 35 | | 25 | 8 | 3 | 238 | 85 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Nalidixinsäure | 3 | 567 | | | 19 | | 3 | 206 | | | 35 | | 34 | 16 | 4 | 214 | 68 | 29 | | | | | | | | |
| | | | Norfloxacin | 3 | 465 | | | 19 | | 3 | 181 | | | 28 | | 12 | 2 | 2 | 214 | 52 | 26 | | | | | | | | |
| | | | Ofloxacin | | 100 | | | 4 | | | 4 | | | 18 | | 4 | 2 | 3 | 94 | 6 | | | | | | | | | |
| | | | Oxolinsäure | 3 | 618 | | | 27 | | 3 | 280 | | | 41 | | 34 | 16 | 4 | 219 | 85 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Sarafloxacin | 3 | 619 | | | 26 | | 3 | 227 | | | 40 | | 34 | 16 | 4 | 219 | 68 | 47 | | | | | | | | |
| | | | Diamino- pyrimidine | B1 F | Baquiloprim | | 49 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 40 | 6 | | | | | | | | |
| Trimethoprim | 3 | 204 | | | 5 | | 4 | | 3 | 16 | | | 7 | | 8 | | 3 | 236 | 13 | 132 | | | | | | | | | |
| Linkosamide | B1 H | Clindamycin | | 89 | | | 4 | | 4 | | | 7 | | 2 | | 3 | 94 | 10 | 23 | | | | | | | | | | |
| | | Lincomycin | 3 | 200 | | | 4 | | 3 | 15 | | | 7 | | 15 | | 1 | 222 | 24 | 66 | | | | | | | | | |
| | | Pirlimycin | | 115 | | | 4 | | | 15 | | | 7 | | 1 | | 1 | 159 | 17 | 25 | | | | | | | | | |
| Macrolide | B1 I | 3-O-Acetyltylosin | | 18 | | | | | 10 | | | | | 1 | | 1 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | Azithromycin | 3 | 75 | | | | | 3 | | | | | 14 | | | 60 | 7 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | Clarithromycin | 3 | 150 | | | | | 3 | 2 | | | 7 | | 7 | | 1 | 148 | 13 | 23 | | | | | | | | | |
| | | Erythromycin | 3 | 276 | | | 21 | | 3 | 169 | | | 17 | | 15 | | 1 | 310 | 24 | 132 | | | | | | | | | |
| | | Josamycin | 3 | 277 | | | 20 | | 3 | 126 | | | 17 | | 15 | | 1 | 215 | 20 | 29 | | | | | | | | | |
| | | Oleandomycin | 3 | 276 | | | 20 | | 3 | 126 | | | 17 | | 15 | | 1 | 315 | 20 | 45 | | | | | | | | | |
| | | Roxithromycin | | 40 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spiramycin | 3 | 277 | | | 20 | | 3 | 126 | | | 17 | | 15 | | 1 | 315 | 24 | 49 | | | | | | | | | |
| | | Josamycin | | 35 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 89 | 8 | | | | | | | | | | |
| | | Spiramycin und Neospiramycin; Summe | | 35 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 89 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | Tilmicosin | 3 | 287 | | | 21 | | 3 | 169 | | | 17 | | 15 | | 1 | 318 | 24 | 75 | | | | | | | | | |
| | | Tulathromycin | | 212 | | | 21 | | | 169 | | | 17 | | | | | 155 | 13 | 5 | | | | | | | | | |
| | | Tylosin | 3 | 287 | | | 20 | | 3 | 126 | | | 17 | | 15 | | 1 | 318 | 24 | 132 | | | | | | | | | |
| | | Acetylisovaleryltylosin | | 115 | | | 4 | | | 15 | | | 7 | | 9 | | 1 | 155 | 13 | 2 | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich

N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | |
|---|--------------|--|--------------|-------------|----|-----|------------------------|-----|----|----|------------|----|----|-----|--------------|-----|-----|-------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | |
| Stoffe mit antibakterieller Wirkung | Tetracycline | B1 M Chlortetracyclin | 3 | 680 | 5 | 13 | 4 | 239 | | | 32 | 30 | 16 | 4 | 584 | 46 | 101 | | | | | | | | | |
| | | Chlortetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | 4 | 376 | | 8 | 4 | 146 | | | 31 | 18 | 8 | 1 | 810 | 34 | 123 | | | | | | | | | |
| | | Doxycyclin | 4 | 758 | 5 | 21 | 5 | 350 | | | 39 | 30 | 16 | 4 | 607 | 51 | 131 | | | | | | | | | |
| | | Epi-Chlortetracyclin | | 60 | | | | 28 | | | | 2 | | | 72 | 6 | 21 | | | | | | | | | |
| | | Epi-Oxytetracyclin | | 60 | | | | 28 | | | | 2 | | | 72 | 6 | 21 | | | | | | | | | |
| | | Epi-Tetracyclin | | 95 | | | | 30 | | | | 4 | 1 | | 72 | 11 | 21 | | | | | | | | | |
| | | Minocyclin | | 35 | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | 43 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | Oxytetracyclin | 3 | 694 | 5 | 13 | 4 | 240 | | | 32 | 30 | 16 | 4 | 589 | 46 | 103 | | | | | | | | | |
| | | Oxytetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | 4 | 361 | | 8 | 4 | 145 | | | 27 | 18 | 8 | 1 | 805 | 34 | 123 | | | | | | | | | |
| | | Rolitetracyclin | | 30 | | | | 1 | | | | 10 | | | 57 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | Tetracyclin | 3 | 645 | 5 | 13 | 4 | 237 | | | 32 | 27 | 15 | 2 | 619 | 41 | 103 | | | | | | | | | |
| | | Tetracyclin, Summe von Muttersubstanz und ihrem 4-Epimer | 4 | 376 | | 8 | 4 | 147 | | | 27 | 18 | 8 | 1 | 833 | 34 | 123 | | | | | | | | | |
| | | Amphenicole | B1 N | Florfenicol | 53 | 149 | 3 | 4 | 54 | 26 | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | 164 | 7 | 3 | | | | | | | | |
| Florfenicolamin | | | | 14 | | 4 | | 2 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| Thiamphenicol | 52 | | | 123 | 3 | 4 | 54 | 26 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 163 | 6 | 3 | | | | | | | | | | |
| Pleuromutiline | B1 O | Tiamulin | 3 | 189 | | 4 | 3 | 15 | | | 7 | 14 | | 159 | 15 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Tiamulin, Summe aller Metaboliten, die zu 8-alpha- hydroxymutilin hydrolysiert | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | |
| | | Valnemulin | | 61 | | 4 | 3 | | | 7 | | | | 50 | 2 | 8 | | | | | | | | | | |
| sonst. Stoffe mit antibakt. Wirkung | B1P | Avilamycin | | 14 | | | | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Avilamycin A | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hemmstoffe | B1 | Hemmstoffest | | 2 | | | | 60 | 1 | | 76 | 17 | 15 | 5 | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---|---|-----|---|------------------------|---|----|---|------------|---|----|----|--------------|---|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Anthelminthika | B2a | 22, 23-Dihydroavermectin | 1 | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | 23 | 11 | | | 635 | | | | | | | | | | |
| | | B1a | 5-Hydroxy-Thiabendazol | | 50 | | 2 | | 26 | | 4 | | | | | | 513 | | | | | | | | | | |
| | | | Abamectin | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 327 | | | | | | | | | | |
| | | | Albendazol | 1 | 150 | | 6 | | 46 | | 17 | | 16 | 6 | | | 748 | 7 | | 1 | | | | | | | |
| | | | Albendazol-2-aminosulfon | | 79 | | 6 | | 50 | | 10 | | 11 | 6 | | | 736 | | | | | | | | | | |
| | | | Albendazolsulfon | | 79 | | 6 | | 50 | | 10 | | 11 | 6 | | | 736 | | | | | | | | | | |
| | | | Albendazolsulfoxid | | 79 | | 6 | | 50 | | 10 | | 11 | 6 | | | 736 | | | | | | | | | | |
| | | | Albendazoloxid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol-2-aminosulfon | 1 | 111 | | 6 | | 51 | | 7 | | 16 | 6 | | | 612 | 7 | | 1 | | | | | | | |
| | | | Aminoflubendazol | | 62 | | 2 | | 26 | | 4 | | 11 | 6 | | | 552 | | | | | | | | | | |
| | | | Aminomebendazol | | 54 | | 2 | | 26 | | 7 | | 11 | 6 | | | 575 | | | | | | | | | | |
| | | | Avermectin B 1 a | 2 | 39 | | 2 | | 7 | | 2 | | 31 | 12 | | | 942 | 7 | | 29 | | | | | | | |
| | | | Cambendazol | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | |
| | | | Closantel | | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | 11 | 6 | | | 339 | | | | | | | | | | |
| | | | Doramectin | 2 | 48 | | 2 | | 7 | | 2 | | 35 | 14 | 2 | | 982 | 7 | | 1 | | | | | | | |
| | | | Emamectin B1a | 1 | 45 | | 2 | | 7 | | 1 | | 28 | 12 | 1 | | 310 | 7 | | 1 | | | | | | | |
| | | | Emamectin B1a/B1b | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eprinomectin | 1 | 34 | | | | 1 | | | | 10 | 3 | 1 | | 518 | 7 | | 1 | | | | | | | |
| | | | Eprinomectin B1a | 1 | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | 24 | 11 | 1 | | 752 | | | | | | | | | | |
| | | | Febantel | | 53 | | 4 | | 37 | | 3 | | | | | | 199 | | | | | | | | | | |
| | Fenbendazol | 1 | 153 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | 6 | | | 798 | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Flubendazol | | 79 | | 6 | | 50 | | 10 | | 11 | 6 | | | 736 | | | | | | | | | | | | |
| | Flubendazol und Aminoflubendazol, Summe | 1 | 113 | | 6 | | 51 | | 10 | | 16 | 6 | | | 606 | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Hydroxymebendazol | | 54 | | 2 | | 26 | | 7 | | 11 | 6 | | | 575 | | | | | | | | | | | | |
| | Ivermectin | 1 | 34 | | | | 1 | | | | 12 | 3 | 2 | | 635 | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Ketotriclabendazol | | 50 | | 2 | | 21 | | 4 | | 11 | 6 | | | 470 | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|--------------|-----|----|----|------------------------|-----|----|----|------------|----|----|----|--------------|---|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier/ eV | Honig/ eV | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Anthelminthika | B2a Levamisol | 1 | 153 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 758 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Mebendazol | 1 | 153 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 797 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Mebendazol, Methyl-(5-(1- hydroxy,1phenyl)methyl-1H- benzimidazol-2-yl) | 1 | 111 | | 6 | | 51 | | 7 | | 16 | | 6 | | | | 581 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Morantel | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | |
| | | Moxidectin | 2 | 48 | | 2 | | 7 | | 2 | | 33 | | 14 | 2 | | | 982 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Netobimin | | 53 | | 4 | | 37 | | 3 | | | | | | | | 199 | | | | | | | | | |
| | | Nitroxinil | | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | 11 | | 6 | | | | 373 | | | | | | | | | |
| | | Oxfendazol | 1 | 153 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 798 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Oxfendazol-sulfon | | 54 | | 2 | | 26 | | 7 | | 11 | | 6 | | | | 575 | | | | | | | | | |
| | | Oxibendazol | 1 | 153 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 798 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Oxyclozanid | | | | | | | | | | | | | | | | 154 | | | | | | | | | |
| | | Rafoxanid | | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | 11 | | 6 | | | | 339 | | | | | | | | | |
| | | Selamectin | 1 | 34 | | | | 1 | | | | 5 | | | | | | 62 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Summe aller extrahierbaren Rückstände, die zu Oxfendazolsulfon | 1 | 147 | | 6 | | 51 | | 14 | | 16 | | 6 | | | | 574 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Ketotriclabendazol, Summe | 1 | 87 | | 2 | | 22 | | 7 | | 16 | | 6 | | | | 495 | 1 | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Thiabendazol | 1 | 115 | | 6 | | 51 | | 10 | | 16 | | 6 | | | | 798 | | 7 | | 41 | | | | | |
| | | Thiabendazol, Summe | 1 | 149 | | 6 | | 51 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 636 | | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Triclabendazol | 1 | 153 | | 6 | | 46 | | 17 | | 16 | | 6 | | | | 748 | 1 | 7 | | 1 | | | | | |
| | | Triclabendazolsulfon | | 54 | | 2 | | 26 | | 7 | | 11 | | 6 | | | | 567 | 1 | | | | | | | | |
| | | Triladabenzolsulfoxid | | 54 | | 2 | | 26 | | 7 | | 11 | | 6 | | | | 567 | 1 | | | | | | | | |
| Kokzidiostatika | B2b 1 | Amprolium | | 22 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | Arprinocid | | 347 | 1 | 15 | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | 218 | | | | | | |
| | | Clazuril | | 21 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| | | Decoquinat | | 372 | 1 | 15 | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | 128 | | | | | | |
| | | Diclazuril | | 373 | 1 | 15 | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | 223 | | | | | | |
| | | Dinitolmid DOT | | 347 | 1 | 15 | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | 212 | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----|------------------------|----|-----|-----|------------|-----|----|----|-----------|---|--------------|---------|---------------|--------|----|--------|---|--------|----|---|-----|-----|-----|--|---|--|--|
| | | | Masthähnchen | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | son- stige | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | | | | | | | | | |
| | | | nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | | EB | SB | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Kokzidiostatika | B2b 1 Dinitrocarbanilid (DNC) | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | |
| | | Ethopabat | | 36 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| | | Halofuginon | | 373 | 1 | 15 | | | | 164 | | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | | 223 | | | | | |
| | | Laidlomycin propionat | | 361 | 1 | 15 | | | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 212 | | | | | |
| | | Kalium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| | | Laidlomycin propionat Kalium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | |
| | | Lasalocid | | 396 | 1 | 15 | | | | 165 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | | |
| | | Maduramicin | | 396 | 1 | 15 | | | | 164 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Meticlorpindol | | 397 | 1 | 15 | | | | 191 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Monensin | | 396 | 1 | 15 | | | | 164 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Narasin | | 396 | 1 | 15 | | | | 191 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Nicarbazin | | 397 | 1 | 15 | | | | 191 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Robenidin | | 373 | 1 | 15 | | | | 191 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 213 | | | | |
| | | Salinomycin | | 396 | 1 | 15 | | | | 164 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 223 | | | | |
| | | Semduramicin | | 333 | 1 | 15 | | | | 191 | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 108 | | | | |
| | | Semduramicin-Na | | 39 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| | | Toltrazuril | | 383 | 1 | 15 | | | | 164 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 196 | | | | |
| | | Toltrazurilsulfon | | 355 | | | | | | 177 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 177 | | | | |
| Toltrazurilsulfoxid | | 296 | | | | | | 148 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 122 | | | | | | |
| Nitroimidazole | B2b 2 | Ipronidazol | 448 | 810 | 32 | 38 | 488 | 393 | 21 | 53 | 30 | 18 | | | | | 253 | 96 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ipronidazol-OH (Metabolit) | 440 | 796 | 32 | 38 | 488 | 392 | 21 | 53 | 30 | 18 | | | | | | 253 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ornidazol | 50 | 88 | 2 | | 43 | 20 | 4 | 8 | 2 | 2 | | | | | | 43 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | Secnidazol | 53 | 91 | 2 | | 45 | 23 | 4 | 8 | 2 | 3 | | | | | | 43 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ternidazol | 65 | 106 | 4 | | 57 | 23 | 10 | 14 | 2 | 5 | | | | | | 43 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | Tinidazol | 188 | 565 | 10 | 25 | 81 | 305 | 3 | 17 | 1 | 1 | | | | | | 42 | 31 | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--|----|----|----|--------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|------|-------|---|---|-----|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier | Honig | | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Sonstige | Carbamate | B2c1 | 3-Hydroxycarbofuran | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 28 |
| Tierarznei- | | | Aldicarb | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| mittel | | | Aldicarb-sulfoxid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Aldoxycarb; Aldicarb-Sulfon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Aminocarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Asulam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Bendiocarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Benfuracarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Butocarboxim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Butoxycarboxim | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 55 |
| | | | Carbaryl | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Carbofuran | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 28 |
| | | | Carbosulfan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Chlorpropham; CIPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | | Desmethyl-formamido-pirimicarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Desmethyl-pirimicarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
| | | | Diallat | | 8 | | | | | 5 | | | | 1 | | 8 | | | | | 7 | | 16 | | | | 28 |
| | | | Diethofencarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Ethiofencarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Fenothiocarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Fenoxycarb | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 |
| | | | Furathiocarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Indoxacarb, Gesamt-, Summe der Isomeren S und R, ausgedrückt als Indoxacarb | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | | Iprovalicarb | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Isoprocarb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | Methiocarb; Mercaptodimethur | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 67 |
| | | | Methiocarb-sulfon; Mercaptodimethur-sulfon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---|----|---|------------------------|---|----|---|------------|---|----|---|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier/ eV | EB/ eV | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Pyrethroide | B2c 2 Etofenprox | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 55 | | |
| | | Fenpropathrin | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| | | Fenvalerat und Esfenvalerat, RR- und SS- Isomere | 1 | | 37 | | 2 | | | | 15 | | | 6 | | 16 | 19 | 1 | 58 | | 55 | | 69 | | |
| | | Fenvalerat und Esfenvalerat RS- und SR- Isomere | 1 | | 34 | | 2 | | | | 13 | | | 6 | | 16 | 19 | 1 | 58 | | 55 | | 69 | | |
| | | Fenvalerat und Esfenvalerat, Summe aus RR-, SS-, RS- und SR Isomere | 1 | | 32 | | 2 | | | | 20 | | | 3 | | 15 | 19 | 1 | 53 | | 32 | | 53 | | |
| | | Flucythrinat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| | | Flumethrin, Summe der trans-Z-Isomere | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | Fluvalinat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lambda-Cyhalothrin, Gesamt- | | | 13 | | | | | | 10 | | | 3 | | 2 | 8 | | 12 | | 37 | | 122 | | |
| | | Permethrin, Gesamt- Pyrethrum | 1 | | 67 | | 7 | | | | 47 | | | 6 | | 16 | 19 | 1 | 57 | | 53 | | 44 | | |
| | | Resmethrin, Gesamt-, Summe der Isomere, ausgedrückt als Resmethrin | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | 1 | | 17 | | 28 | | |
| | | Tau-Fluvalinat | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | 1 | 8 | | 7 | | 17 | | 67 | | |
| | | Tetramethrin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| | | trans-Permethrin | | | 3 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | Eier | Honig | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|---|---------|----|------------------------|----|---------|---|------------|---|-----------|---|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|----|---|---|---|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | |
| | | | EB N | P | SB N | P | EB N | P | SB N | P | EB N | P | SB N | P | EB N | P | EB N | P | N | P | N | P | N | P | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | Beruhigungsmittel/ Sedativa | Acepromazin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | |
| | | Azaperol | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | |
| | | Azaperon | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | |
| | | Carazolol | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | |
| | | Diazepam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Haloperidol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Methapyrilen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oxazepam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promazin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | |
| | | Promethazin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Propionylpromazin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | |
| | | Xylazin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | |
| NSAIDs | B2e | 4-Acetylamino-Antipyrin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | |
| | | 4-Formylamino-Antipyrin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | | | |
| | | 4-Hydroxyantipyrin | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | |
| | | 4-Methylamino-Antipyrin 4-Methylaminophenazon | | | 20 | | | 18 | | | | | 3 | | | | | | | 190 | | | | | |
| | | 5-Hydroxyflunixin | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.001 | | | | | |
| | | 5-Hydroxyflunixinhydroxid | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 552 | | | | | |
| | | Acetaminophen | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 1 | | | | |
| | | Paracetamol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aminopyrin Aminoantipyrin | | | 10 | | | 18 | | | | | 3 | | | | | | | 190 | | | | | |
| | | Aminophenazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dimethylaminophenazon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ampyron; 4-Amino-Antipyrin; 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-aminopyrazolon | | | 13 | | | 18 | | | | | 3 | | | | | | | 45 | | | | | |
| Carprofen | | | 58 | | | 23 | | | | | 39 | | | | | | | 916 | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier/ eV | Honig/ eV | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Sonstige Tierarznei- mittel | NSAIDs | B2e Carprofen und Carprofen Glukoronidkonjugat, Summe | | 6 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Diclofenac | | 58 | | 23 | | 39 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 905 | | |
| | | Dipyron Metamizol Anhydrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| | | Firocoxib | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | Flufenaminsäure | | 22 | | 20 | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 586 | | |
| | | Flunixin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| | | Flunixin Meglumin | | 68 | | 23 | | 39 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 828 | | |
| | | Flurbiprofen | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | | |
| | | Ibuprofen | | 26 | | 2 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1.029 | | |
| | | Ketoprofen | | 28 | | 20 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1.129 | | |
| | | Meclofenaminsäure | | 19 | | 2 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 591 | | |
| | | Mefenaminsäure | | 28 | | 20 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1.129 | | |
| | | Meloxicam | | 68 | | 23 | | 39 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 1.352 | | |
| | | Metamizol (freie Säure) | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| | | Dipyron Noramidopyrin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Naproxen | | 28 | | 20 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 841 | | |
| | | Nifluminsäure | | 22 | | 20 | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 593 | | |
| | | Oxyphenbutazon Anhydrat | | 13 | | 2 | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 489 | | |
| | | Oxyphenbutazon Monohydrat | | 9 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 204 | | |
| | | Phenazon | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | | |
| | | Phenylbutazon | | 22 | | 2 | 25 | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1.351 | | |
| | | Piroxicam | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| | | Propyphenazon | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | |
| | | Ramifenazon Isopyrin | | 10 | | 18 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 180 | | |
| | | Salicylsäure | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | |
| | | Suxibuzon | | 2 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | Tolfenaminsäure | | 58 | | 23 | | 39 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 1.204 | | |
| | | Vedaprofen | | 58 | | 23 | | 39 | | 8 | | | | | | | | | | | | | 1.350 | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | |
|--|---|--|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|-----|----|--------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | N | P | N | P | | | | | | |
| Sonstige Tierarzneimittel | Sonstige Stoffe mit antibakterieller und zugleich antiprotozoischer Wirkung | B2f1 Clorsulon | | 14 | | 4 | | 2 | | | | | | | | 39 | | | | | | | | |
| | | Praziquantel | | 14 | | 2 | | 6 | | 2 | | | 13 | 8 | | 373 | | | | | | | | |
| Sonstige Ektoparasitika | B2f 2 | Amitraz | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | |
| | | Amitraz, Gesamt-, einschließlich aller Metaboliten, die Cymiazol | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 91 | 1 | | | | | |
| | | Diflubenzuron Teflubenzuron | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 120 | 55 | | | | | |
| Synthetische Kortikosteroide | B2f 3 | Betamethason | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | 60 | | | | | | | | |
| | | Dexamethason | | 17 | | | | | | | | | 8 | | | 60 | | | | | | | | |
| | | Flumethason | | 7 | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | |
| | | Methylprednisolon | | 7 | | | | | | | | | | 8 | | 60 | | | | | | | | |
| | | Prednisolon | | 7 | | | | | | | | | | 8 | | 60 | | | | | | | | |
| | | Triamcinolon Triamcinolonacetonid | | 7 | | | | | | | | | | | | 59 | 1 | | | | | | | |
| Sonstige Stoffe mit pharmakolog. Wirkung | B2f 4 | Cotinin, Metabolit von Nikotin | 27 | 15 | 17 | | 33 | 2 | 2 | | | | | | | | | 117 | | | | | | |
| | | Metoprolol | 18 | 24 | | | 32 | 6 | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nikotin | 27 | 15 | 17 | 1 | 33 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 117 | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|-----|---|------------------------|---|----|---|------------|---|----|----|--------------|---|----------|---------|----------|--------|------|-------|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier | Honig | | | | | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | organische Chlorverb., einschl. PCB | B3a Aldrin | 1 | | 123 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 6 | | 43 | | 22 | | 1 | | 114 | | 116 | | 28 | |
| | | alpha(cis)-Chlordan | 1 | | 128 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 29 | |
| | | alpha-Endosulfan | 1 | | 123 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 6 | | 45 | | 22 | | 2 | | 114 | | 116 | | 28 | |
| | | alpha-HCH | 1 | | 123 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 6 | | 45 | | 22 | | 2 | | 114 | | 116 | | 98 | |
| | | beta-Endosulfan | 1 | | 123 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 6 | | 45 | | 22 | | 2 | | 114 | | 116 | | 28 | |
| | | beta-HCH | 1 | | 128 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 99 | |
| | | Bromocyclen | 1 | | 128 | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | | |
| | | Brompropylat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 74 |
| | | Chinomethionat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | | Chlorbenzilat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | 17 | | 98 |
| | | Chlordan, Summe | | | | | | | | | 5 | | | | 46 | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | | 12 | | 64 | | 28 |
| | | Chlordan und Oxychlordan, Summe aus alpha(cis)- u. gamma(trans)- Chlordan und | 1 | | 109 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 5 | | 38 | | 22 | | 1 | | 101 | | 111 | | |
| | | Chlorpropylat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | cis-Heptachlorepoxyd | 1 | | 128 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 29 |
| | | cis-Nonachlor | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 5 | | 2 | | 1 | | | | 9 | | 32 | | |
| | | DDT, Summe | 1 | | 117 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 44 | | 22 | | 2 | | 110 | | 109 | | 78 |
| | | delta-HCH | 1 | | 102 | | | | | | 7 | | | | 55 | | | | | 7 | | 37 | | 13 | | 1 | | 79 | | 97 | | 32 |
| | | Delta-Ketoendrin | 1 | | 115 | | | | | | 7 | | | | 58 | | | | | 7 | | 43 | | 14 | | 2 | | 97 | | 108 | | |
| | | Dicamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Dieldrin | 1 | | 128 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 29 |
| Dieldrin, Summe | 1 | | 116 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 7 | | 40 | | 21 | | 1 | | 105 | | 123 | | 29 | | |
| Endosulfan-sulfat | 1 | | 128 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 8 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 29 | | |
| Endosulfan, Summe | 1 | | 114 | | | | | | 7 | | | | 63 | | | | | 7 | | 39 | | 22 | | 1 | | 109 | | 123 | | 29 | | |
| Endrin | 1 | | 124 | | | | | | 7 | | | | 60 | | | | | 6 | | 46 | | 22 | | 2 | | 118 | | 125 | | 29 | | |
| Endrin, Summe | 1 | | 97 | | | | | | 7 | | | | 52 | | | | | 7 | | 23 | | 13 | | 1 | | 53 | | 81 | | | | |
| epsilon-HCH | 1 | | 29 | | | | | | 2 | | | | 8 | | | | | | 5 | | 18 | | 12 | | 1 | | 61 | | 31 | | 1 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|------|-------|----|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | Eier | Honig | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Andere Stoffe und Kontaminanten | organische Chlorverb., einschl. PCB | B3a Flucythrinat, Gesamt-, Summe der Isomere, berechnet als Flucythrinat | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | 2 | |
| | | Flurochloridon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | gamma(trans)-Chlordan | 1 | 128 | | 7 | | | 63 | | | 8 | | 46 | 22 | 2 | | | 114 | | 125 | | | 29 | |
| | | HCH, Summe | | 8 | | | | | | | | 2 | | 4 | 1 | | | | 15 | | 14 | | | 32 | |
| | | Heptachlor (alpha- und beta-Isomer) | 1 | 128 | | 7 | | | 63 | | | 8 | | 45 | 21 | 2 | | | 118 | | 125 | | | 29 | |
| | | Heptachlor, Summe | 1 | 119 | | 7 | | | 63 | | | 7 | | 39 | 21 | 1 | | | 108 | | 123 | | | 29 | |
| | | Hexachlorbenzol HCB | 1 | 128 | | 7 | | | 63 | | | 8 | | 46 | 22 | 2 | | | 118 | | 125 | 1 | | 99 | |
| | | Imazalil | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | | Isodrin | | 5 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 | | 9 | | | | 1 |
| | | Lindan; gamma-Hexachlorcyclohexan; gamma-HCH | 1 | 128 | | 7 | | | 63 | | | 8 | | 46 | 22 | 2 | | | 118 | | 125 | | | | 99 |
| | | Linuron | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Methoxychlor | 1 | 39 | | 2 | | | 17 | | | 5 | | 34 | 12 | 1 | | | 84 | | 57 | | | | 29 |
| | | Mirex | 1 | 101 | | 7 | | | 52 | | | 7 | | 16 | 12 | 1 | | | 55 | | 92 | | | | 1 |
| | | Nitrofen | 1 | 113 | | 7 | | | 63 | | | 7 | | 36 | 20 | 1 | | | 99 | | 116 | | | | 28 |
| | | OCDD | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | | 77 | | | | |
| | | Octachlordibenzodioxin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OCDF | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 5 | | 77 | | | | |
| | | Octachlordibenzofuran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octachlordipropylether S 421 | | | | | | | 6 | | | | | 14 | | | | | 6 | | 5 | | | | |
| | | Octachlorstyrol | | 6 | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | 6 | | | | |
| | | op-DDD | 1 | 46 | | 2 | | | 17 | | | 5 | | 43 | 13 | 2 | | | 80 | | 59 | | | | 32 |
| | | op-DDE | 1 | 41 | | 2 | | | 14 | | | 5 | | 42 | 13 | 2 | | | 84 | | 54 | | | | 32 |
| | | op-DDT | 1 | 128 | | 7 | | | 63 | | | 8 | | 46 | 22 | 2 | | | 118 | | 125 | | | | 99 |
| | | Oxychlordan | 1 | 123 | | 7 | | | 63 | | | 7 | | 45 | 22 | 2 | | | 114 | | 125 | | | | 29 |
| | | Parlar 26 | | 12 | | | | | | | | 2 | | 21 | 1 | 1 | | | 4 | | 26 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|-----|---|---|-----|----|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | | | | | |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | | | | |
| Andere Stoffe und Kontaminanten | organische Chlorverb., einschl. PCB | B3a WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (WHO-TEF 2005) upper bound | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 105 | 2 | | | | |
| | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 1997) upper bound | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | 11 | | |
| | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) lower bound | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 50 | | |
| | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) medium bound | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 43 | | |
| | | WHO-PCDD/F-TEQ (WHO-TEF 2005) upper bound | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 112 | | |
| | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 | | 77 | | |
| | | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,7,8-PeCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 1,2,3,7,8-PeCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 2,3,4,7,8-PeCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 2,3,7,8-TeCDD | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |
| | | 2,3,7,8-TeCDF | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 77 | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----|-------|----------|---------|----------|--------|----|--------|----|--------|----|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N | P | N |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Organische Phosphorverbin- dungen | B3b Azinphos-ethyl | | 2 | | 12 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 16 | | 28 | | | |
| | | Azinphos-methyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 28 | | |
| | | Carbophenothion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 28 | | |
| | | Chlordimeform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| | | Chlorfenvinphos, Gesamt-, E- und Z-Isomere | | 2 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 16 | | 40 | | |
| | | Chlorpyrifos | | 4 | | 11 | | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 11 | | 21 | | 28 | |
| | | Chlorpyrifos-methyl | | 4 | | 11 | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 7 | | 18 | | 28 | |
| | | Clothianidin | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | |
| | | Coumaphos | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 95 | |
| | | Diazinon | 1 | 33 | 9 | 14 | | | | 13 | | | 6 | | 1 | 8 | | | | | | | 92 | | 53 | | 28 | |
| | | Dichlorvos; DDVP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 28 | |
| | | Dimethoat | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | |
| | | Dioxathion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 28 | |
| | | Ethion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 40 | |
| | | Ethoprophos | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| | | Fenchlorphos; Ronnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 30 | |
| | | Fenitrothion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 40 | |
| | | Fenthion | | 2 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 16 | | 40 | |
| | | Fenthion-oxon | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| | | Fenthion-oxon-sulfon | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| Fenthion-oxon-sulfoxid | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| Fenthion-sulfon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| Fenthion-sulfoxid | | 2 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 16 | | 40 | | |
| Flonicamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 28 | | | |
| Heptenophos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 28 | | | |
| Iodofenphos; Jodfenphos | | | | | | | | 6 | | | | | 14 | | | | | | | | 10 | | 5 | | 28 | | | |
| Malaoxon | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| Malathion | | 2 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | | 96 | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|----|---|------------------------|---|----|---|------------|---|----|---|--------------|---|----|-------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|----|---|---|--|--|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | | | | | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Organische Phosphorverbin- dungen | B3b Malathion und Malaoxon, Summe aus Malathion und Malaoxon Methacrifos Methidathion Mevinphos, Gesamt-, Summe der E- und Z- Isomeren, ausgedrückt als Mevinphos Omethoat Paraoxon-methyl Parathion Parathion-methyl Parathion-methyl, Summe aus Parathion-methyl und Paraoxon-methyl, Phorat Phosalon Phosmet Phosmetoxon Phosmet, Summe aus Phosmet und Phosmet- oxon, ausgedrückt als Phosmet Phoxim Pirimiphos-methyl Profenofos Propetamphos Pyrazophos Pyridafenthion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | |
|---|--------------|---|--------------|-----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|-----|-----|----|--------------|----|----------|---------|----------|--------|--------|--------|-----|---|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Mykotoxine | B3d Aflatoxin B1 | | 51 | | 4 | | 27 | | 5 | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | Aflatoxin M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| | | alpha-Zearalenol | 52 | 115 | 6 | 5 | 57 | 43 | 5 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | beta-Zearalenol | 52 | 115 | 6 | 5 | 57 | 43 | 5 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ochratoxin A Zearalenon; Mycotoxin F | 52 | 115 | 6 | 5 | 57 | 43 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | |
| Farbstoffe | B3e | Brillantgrün Malachitgrün G CI 42040 | | | | | | | | | 256 | 125 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Brillantgrün | | | | | | | | | 27 | 19 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Kristallviolett | | | | | | | | | 49 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Malachitgrün | | | | | | | | | 60 | 1 | 49 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Kristallviolett; Basic Violet 3 CI 42555 | | | | | | | | | 282 | | 127 | 18 | | | | | | | | | | |
| | | Leukokristallviolett | | | | | | | | | 252 | 1 | 126 | 18 | | | | | | | | | | |
| | | Leukomalachitgrün Malachitgrün CI 42000 | | | | | | | | | 282 | 3 | 127 | 1 | 18 | | | | | | | | | |
| sonstige | B3f | Boscalid; Nicobifen | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | | |
| | | Dimethomorph | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | | Fenpropimorph | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | |
| | | Fluazifop-butyl | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| | | Fluazifop, freie Säure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| | | Fluazifop-P-Butyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| | | Moschus-Ambrette | | 5 | | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 9 | |
| | | Moschus-Keton | 1 | 111 | | 7 | | | 63 | | | 7 | 41 | 22 | 2 | 87 | 117 | | | | | | | |
| | | Moschus-Musken | | 5 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 9 | |
| | | Moschus-Tibeten | | 5 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 9 | |
| | | Moschus-Xylol | 1 | 111 | | 7 | | | 63 | | | 7 | 41 | 22 | 2 | 87 | 117 | | | | | | | |
| | | N,N-Diethyl-m-toluamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 2 |
| | | DEET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
 N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | |
|---|--------------|--|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|----|----|--------------|----|----------|---------|----------|--------|--------|--------|----|----|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | sonstige | EB/ eV | EB/ eV | EB/ eV | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | N |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | Amide | B3f1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | |
| | | Acetamiprid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dimoxystrobin | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Flutolanil | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Iprodion; Glyphen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | | Metazachlor | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Tebufenpyrad | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Zoxamid | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| Azole | B3f3 | Bromuconazol, Gesamt-, Summe der Diastereoisomeren, ausgedrückt als Bromuconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| | | Cyproconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Difenoconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Epoxiconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Fenbuconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Fipronil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Fipronil-sulfon (MB46136) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Fluquinconazol | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 55 |
| | | Flusilazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Flutriafol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | | Hexaconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Metconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Myclobutanil | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 67 |
| | | Paclobutrazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | Propiconazol | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | | | | Milch | | Eier | | Honig | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|----|---|------------------------|---|----|---|------------|---|----|---|--------------|---|----|---|----------|---|---------|---|---------------|---|--------|----|--------|----|--------|--|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | | | sonstiges | | | | Forellen | | Karpfen | | son- stige | | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | |
| | | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | SB | | EB | | EB | | EB/ eV | | EB/ eV | | EB/ eV | | | |
| | | | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | sonstige organische Stickstoffverbin- dungen | B3f20 Fenamidon | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| | | Fenhexamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | Fenpropidin | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | |
| | | Fluoxastrobin | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 55 | | | |
| | | Hexythiazox | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | Isoproturon | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| | | Mepanipyrim | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| | | Pyridat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | |
| | | Pyriproxyfen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| | | Quinoxifen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| | | Trifloxystrobin | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | |
| Organische Schwefelverbin- dungen | B3f21 Propargit | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 67 | | | | |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde

-Tabelle III: Einzelergebnisse-

(" " Untersuchungen nicht indiziert bzw. nicht vorgesehen)

| Stoffgruppen | Untergruppen | Stoffe nach Richtlinie 96/23/EG Anhang I | Geflügel | | | | | | | | | | Aquakulturen | | | Milch | | Eier | | Honig | | |
|---|--|---|--------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|------------|----|--------------|----|----------|---------|---------------|--------|------|--------|---|----|
| | | | Masthähnchen | | | | Lege-/ Suppenhühner | | | | Truthühner | | sonstiges | | Forellen | Karpfen | son- stige | EB/ eV | Eier | EB/ eV | | |
| | | | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | EB | EB | N | P | N | P | N | P | |
| N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | | | |
| Andere Stoffe und Kontami- nanten | sonstige organische Verbindungen | B3f31 2,4,6-Tribromanilin | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | | |
| | | 2,4,6-Tribromanisol | 1 | | | 21 | | | 2 | | | 14 | | | 3 | | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
| | | BDE 100 2,2',4,4',6- Pentabromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | BDE 153 2,2',4,4',5,5'- Hexabromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | BDE 154 2,2',4,4',5,6- Hexabromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | BDE 28 2,4,4'- Tribromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | BDE 47 2,2',4,4'- Tetrabromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | BDE 99 2,2',4,4',5- Pentabromdiphenylether | | | | | | | | | 6 | | | 14 | | | | 6 | 5 | | | |
| | | Famoxadone | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 55 |
| | | Haloxyfop-Ethoxyethylester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Haloxyfop, freie Säure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
| | | Haloxyfop, Gesamt-, einschließlich Haloxyfop-R und die Konjugate von Haloxyfop-Methylester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | | Triclosan-methyl | 1 | | | 21 | | | 1 | | | 14 | | | 3 | | 16 | 1 | | | 6 | 21 |

EB =Probenahme im Erzeugerbetrieb, SB =Probenahme im Schlachtbetrieb, eV =Probenahme auf der ersten Verarbeitungsstufe, "/" wahlweise Probenahme möglich
N =Anzahl untersuchter Tiere oder Erzeugnisse, P =Anzahl positiver Befunde