



## Übersicht über die mittlere Acrylamid-Belastung (Mediane) nach Warengruppen von 2003 bis 2007

Warengruppe	3. Signalwert- Berechnung 26.11.2003 Median [Acrylamid in µg/kg]	4. Signalwert- Berechnung 17.11.2004 Median [Acrylamid in µg/kg]	5. Signalwert- Berechnung 21.10.2005 Median [Acrylamid in µg/kg]	6. Signalwert- Berechnung 04.01.2007 Median [Acrylamid in µg/kg]	7. Signalwert- Berechnung 23.01.2008 Median [Acrylamid in µg/kg]
Getreideprodukte:					
Knäckebrot	251	340	276	289	311
Frühstückscerealien	35	40	50	-	28
Feine Backwaren aus Mürbeteig	104	136	118	139	50
Dauerbackwaren für Diabetiker	551	189	186	187	225
Zwieback oder Kekse für Säuglinge und Kleinkinder	105	73	81	60	66
Lebkuchen und lebkuchenhaltige Gebäcke	430	251	233	348	319
Spekulatius	269	181	230	142	132
Kartoffelprodukte:					
Kartoffelchips	556	395	363	396	394
Pommes frites, zubereitet	195	171	212	193	227
Kartoffelpuffer	308	341	675	452	284
Kaffeeprodukte:					
Kaffee, geröstet	276	277	268	166	195
Kaffee, löslich	732	852	857	904	836
Kaffeersatz	852	972	710	511	540